

# Oftahist 1 mg/ ml, krople do oczu, 5 ml



Cena: 42,08 zł

## Opis słownikowy

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Dla kogo        | Dla kobiet, Dla mężczyzn |
| Marka           | OFTAHIST                 |
| Opakowanie      | 1 butelka po 5 ml        |
| Postać          | Krople do oczu           |
| Producent       | ADAMED PHARMA S.A.       |
| Przeznaczenie   | Przeciwalergiczne        |
| Rodzaj produktu | Produkt leczniczy        |
| Wiek            | Dla dorosłych            |

## Opis produktu

### Opis

**Oftahist 1 mg/ml** to lek dostępny bez recepty, stosowany w leczeniu alergicznych chorób oczu. Przeznaczony jest dla dorosłych pacjentów z alergicznym zapaleniem spojówek, które objawia się swędzeniem, łzawieniem, zaczerwienieniem oraz obrzękiem powierzchni oka.

Działanie kropli do oczu Oftahist polega na łagodzeniu reakcji alergicznych. Substancją czynną jest olopatadyna (w postaci chlorowodoru), która antagonizuje działanie histaminy i zapobiega wytwarzaniu cytokin przez komórki nabłonka spojówki pod wpływem histaminy.

Lek stosuje się miejscowo do worka spojówkowego, a czas leczenia wynosi do dwóch tygodni. Po konsultacji z lekarzem, w razie potrzeby, leczenie może być przedłużone do czterech miesięcy.

Krople Oftahist są dostępne w buteleczce o pojemności 5 ml, którą należy wyrzucić cztery tygodnie po pierwszym otwarciu.

### Wskazania

Krople do oczu Oftahist 1 mg/ ml stosuje się u osób dorosłych z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek: w leczeniu objawów ocznych:

- świądu,
- łzawienia, zaczerwienienia,
- obrzęku powiek i spojówek.

### Działanie

Zmniejszenie nasilenia reakcji uczuleniowych oka wywołanych alergenami.

### Dawkowanie

Dorośli: 1 kropla do oka lub oczu, dwa razy na dobę (rano i wieczorem), bezpośrednio do worka spojówkowego.

### Skład

1 ml leku zawiera:

- substancję czynną: olopatadyna w postaci chlorowodoru 1 mg,
- substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, disodu fosforan bezwodny, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań.

#### Przeciwwskazania

- Uczulenie na olopatadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Wiek poniżej 18 roku życia.

#### Działania niepożądane

Często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

- działania dotyczące oka: ból oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia wewnątrz oka,
- objawy ogólne: bóle głowy, nieprzyjemny smak w ustach, suchość błony śluzowej nosa, zmęczenie.

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

- działania dotyczące oka: zaburzenia rogówki, zapalenie powierzchni oka z uszkodzeniem jego powierzchni lub bez uszkodzenia, wydzielina z oka, nadwrażliwość na światło, niewyraźne lub ograniczone widzenie, kurcz powiek, uczucie dyskomfortu w oku, świąd oka, zaburzenia spojówek, uczucie obecności ciała obcego w oku, zwiększone wytwarzanie łez, zaczerwienienie lub obrzęk powiek, nieprawidłowości w obrębie powiek, zaczerwienienie oka,
- objawy ogólne: zapalenie błony śluzowej nosa, zawroty głowy, nieprawidłowe lub upośledzone czucie, zapalenie skóry (kontaktowe), uczucie pieczenia skóry, suchość skóry.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- działania dotyczące oka: obrzęk rogówki, obrzęk oka, zapalenie spojówek, zmiana wielkości źrenicy, zaburzenia widzenia, strupki na brzegach powiek,
- objawy ogólne: nadwrażliwość, obrzęk twarzy, senność, duszność, zapalenie zatok, nudności, wymioty, zapalenie skóry i jej zaczerwienienie, ogólne osłabienie, złe samopoczucie.

#### Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem Oftahist należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent nie jest pewny czy występujące objawy wywołane są przez alergię, zwłaszcza, gdy objawy obejmują tylko jedno oko, występują zaburzenia widzenia lub w przypadku bólu oka, któremu nie towarzyszą objawy ze strony nosa.
- Przed zastosowaniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe.
- Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co najmniej 5-10 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.
- Oftahist zawiera chlorek benzalkoniowy, mogący wywoływać podrażnienia oka. Substancja ta wywołuje zmianę koloru miękkich soczewek kontaktowych, więc przed zakropleniem oczu należy je zdjąć oraz zaleca się zachować minimum 15 minut przerwy między aplikacją leku a założeniem ich.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Aby zapobiec zakażeniom butelkę należy wyrzucić po upływie czterech tygodni od jej pierwszego otwarcia, a potem używać następną butelkę leku. Datę otwarcia butelki należy zapisać na wolnej powierzchni etykiety i pudełka.

#### Producent

Adamed Pharma S.A.  
Pieńków, ul. M. Adamkiewicza 6A  
05-152 Czosnów

## Galeria

