

Oktaseptal (0,1 g + 2 g)/ 100 g, aerozol na skórę, 250 ml



Cena: 38,39 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OKTASEPTAL
Opakowanie	250 ml
Postać	Aerozol
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Przeznaczenie	Antybakteryjne (przeciwbakteryjne), Dezynfekujące (odkażające)
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla niemowlaka, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Preparat posiada właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze. Dichlorowodorek oktenidyny, związku kationowo-czynnego z dwoma aktywnymi centrami, działa na powierzchni rany i skóry. Fenoksyetanol uzupełnia działanie dichlorowodoru oktenidyny, penetrując głębsze warstwy skóry i błon śluzowych. Płyn działa szybko, niszcząc lub inaktywując mikroorganizmy oraz wirusy, jak Herpes simplex, HBV i HIV, już po minucie od aplikacji. Skuteczność działania preparatu utrzymuje się przez godzinę, co zapewnia bezpieczeństwo podczas wykonywania zabiegów diagnostycznych, terapeutycznych lub operacyjnych.

Wskazania

- Odkazanie i wspomagające leczenie małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcja skóry przed zabiegami niechirurgicznymi.
- Wspomagające postępowanie antyseptyczne w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach - np. szwów pozabiegowych.
- Wielokrotne, krótkotrwałe leczenie antyseptyczne w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądź prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego.
- W pediatrii (m.in. do pielęgnacji kikutu pępowninowego).
- Dezynfekcja jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej).
- Ograniczone czasowo, wspomagające leczenie antyseptyczne grzybicy międzypalcowej.
- W obrębie narządów rodnych np. w stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołądź prącia mężczyzny.

Preparat jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w każdym wieku.

Działanie

Preparat działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo.

Dawkowanie

Dezynfekcja skóry i błon śluzowych

- Partie skóry i błon śluzowych, które mają być poddane zabiegowi muszą być dokładnie zwilżone jałowym gazikiem nasączonym preparatem lub zwilżone poprzez rozpylenie leku bezpośrednio na dostępne partie skóry i błon śluzowych. Należy przestrzegać wymaganego czasu oddziaływania - minimum 1 min, wskazane przedłużenie czasu do 5 min. Należy równomiernie zwilżyć całą powierzchnię i pozostawić na co najmniej 1 min. Wspomagająco w leczeniu grzybic skóry, między palcami stóp lek rozpylać na chore powierzchnie rano i wieczorem przez okres 14 dni.

Antyseptyka powierzchownych ran

- Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym lekiem. Lek należy używać zawsze przy każdej zmianie opatrunku. W ranach z wysiękiem należy użyć preparatu w postaci przymoczek, zapewniając kontakt z raną oraz jej nawilżenie przez minimum 1 min, wskazane przedłużenie czasu do 5 min.

Pielęgnacja szwów pooperacyjnych

- Ranę należy spryskać lub przetrzeć jałowym gazikiem nasączonym lekiem. Lek należy używać zawsze przy każdej zmianie opatrunku. Preparat działa odkażająco oraz znieczulająco. Odkazenie otoczenia rany należy przeprowadzać za pomocą jałowego gazika nasączonego nierozcieńczonym preparatem i przemywać promienią od środka na zewnątrz rany.

Antyseptyka błony śluzowej pochwy

- Należy zwilżyć preparatem powierzchnię błony śluzowej pochwy zapewniając kontakt leku z błoną śluzową przez minimum 1 min. W licznych badaniach klinicznych wykazano, że preparat skutecznie działa bakteriobójczo na różne bakterie m.in. Gram-dodatnie i Gram-ujemne.

Antyseptyka żołądki prącia mężczyzny

- Należy zwilżyć preparatem powierzchnię błony śluzowej żołądki prącia zapewniając kontakt leku z błoną śluzową przez minimum 1 min.

Dezynfekcja jamy ustnej

- Jamę ustną należy płukać intensywnie ilością 20 ml preparatu przez 20 sekund.

Pielęgnacja kikuta pępowinowego

- Do pielęgnacji kikuta pępowinowego należy używać gazika nasączonego lekiem. Po 1 min należy osuszyć kikut oraz skórę wokół. Należy utrzymywać kikut pępowinowy dziecka w czystości i suchości.

Skład

100 g roztworu zawiera:

- 0,10 g dichlorowodoru oktenidyny i 2 g fenoksyetanolu.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na dichlorowodorek oktenidyny, fenoksyetanol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Preparatu nie należy stosować do płukania jamy brzusznej.
- Dichlorowodorek oktenidyny jest bardziej toksyczny przy stosowaniu dożylnym niż doustnym, dlatego należy unikać przedostawania się leku w większych ilościach do krwiobiegu, np. na skutek pomyłkowej iniekcji. Z uwagi na to, że dichlorowodorek oktenidyny w preparacie występuje tylko w ilości 0,1%, zagrożenie tą substancją jest mało prawdopodobne.

Działania niepożądane

- Po zwilżeniu błony śluzowej pochwy rzadko może być odczuwane wrażenie ciepła lub pieczenia.

- Po płukaniu jamy ustnej gorzki smak utrzymuje się około 1 h, ma to związek z działaniem preparatu.

Ostrzeżenia

- W celu uniknięcia możliwości uszkodzenia tkanek, obrzęku miejscowego nie wolno wstrzykiwać lub wprowadzać leku do tkanki pod ciśnieniem.
- W każdym przypadku należy zapewnić odpowiedni odpływ z jam rany (np. drenaż, odsysacz). Stosowanie roztworu wodnego oktenidyny (0,1%, z fenoksyetanolem lub bez) do odkażania skóry przed zabiegami inwazyjnymi wiązało się z ciężkimi reakcjami skórными u wcześniaków z małą masą urodzeniową.
- Przed rozpoczęciem dalszych etapów interwencji należy usunąć wszelkie nasączone roztworem materiały, osłony lub fartuchy.
- Nie należy stosować nadmiernych ilości ani nie należy dopuszczać do gromadzenia się roztworu w fałdach skóry lub pod pacjentem oraz do kapania na podkłady lub inne materiały, które stykają się bezpośrednio z pacjentem.
- Przed nałożeniem opatrunku okluzyjnego na miejsca, które były wcześniej poddane działaniu leku, należy upewnić się, że nie pozostał jego nadmiar.
- Nie należy stosować leku do oka.
- Nie zaleca się stosowania preparatu do wnętrza ucha oraz nie należy dopuszczać do jego połykania.

Producent

UNIA
Chłodna 56/60
Warszawa