

Oktaseptal, (0,10 g+2,00 g)/100 g, aerozol na skórę, 60 ml



Cena: 20,69 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	60 ml
Postać	Aerozol
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE "UNIA" SPÓŁDZIELNIA PRACY
Przeznaczenie	Antyseptyczne, Dezynfekujące, odkażające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Oktaseptal to lek stosowany do odkażania ran i skóry.

Wskazania

Oktaseptal jest przeznaczony do stosowania na niezbyt rozległe rany oraz przed i po niedużych zabiegach operacyjnych.

Działanie

Lek Oktaseptal działa na powierzchni rany i skóry.

Dawkowanie

Dezynfekcja skóry i błon śluzowych:

- Nasączyć jałowy gazik lekiem Oktaseptal i dokładnie przemywać miejsca, które mają być poddane zabiegowi. Po dokładnym zwilżeniu lekiem skóry lub błon śluzowych należy odczekać minimum 1 minutę.

Dezynfekcja jamy ustnej:

- Jamę ustną należy płukać ilością 20 ml leku przez 20 sekund. Nie należy dopuścić do połknięcia leku.

Leczenie drobnych ran oparzeniowych lub ran powstałych w przebiegu chorób układowych:

- Lek Oktaseptal należy stosować w postaci przymoczek. Gaziki należy zmieniać raz lub dwa razy na dobę.

Pielęgnacja ran i szwów pooperacyjnych:

- Lek działa odkażająco oraz znieczulająco. Oczyszcza rany z martwych tkanek i wydzieliny, stymulując proces gojenia. Jałowy

gazik należy nasączyć lekiem Okaseptal i przemywać od środka na zewnątrz rany (a nie odwrotnie).

Wspomagająco w leczeniu grzybicy skóry, także grzybicy międzypalcowej stóp:

- Lek należy rozpylać na chore powierzchnie skóry rano i wieczorem przez 14 dni.

Skład

- Substancjami czynnymi są: oktenidyny dichlorowodorek i fenoksyetanol.
- 100 g aerozolu na skórę zawiera 0,10 g oktenidyny dichlorowodorku i 2 g fenoksyetanolu.
- Substancje pomocnicze: glicerol 85%, sodu D-glukonian, betaina kokamidopropylowa 30%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oktaseptal:

- jeśli pacjent ma uczulenie na oktenidyny dichlorowodorek, fenoksyetanol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- do płukania jamy brzusznej, pęcherza moczowego ani błony bębenkowej.

Działania niepożądane

Rzadkie występujące działania niepożądane (1 na 1000 osób):

- odczucie pieczenia,
- zaczerwienienie,
- świąd,
- uczucie ciepła.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (1 na 10000 osób):

- kontaktowe reakcje uczuleniowe np. przemijające zaczerwienienie w miejscu zastosowania.

Nieznana częstość występowania działań niepożądanych:

- Po przepłukaniu głębokich ran za pomocą strzykawki donoszono o przypadkach uporczywego obrzęku, rumienia i martwicy tkanki.

Ostrzeżenia

- Leku Oktaseptal nie wolno połykać ani dopuszczać do przedostania się leku do krwiobiegu np. w wyniku przypadkowego wstrzyknięcia.
- W grzybicy międzypalcowej Oktaseptal jest stosowany wyłącznie w ograniczonych czasowo wspomagającym leczeniu antyseptycznym

Producent

UNIA
Chłodna 56/60
Warszawa