

Olfen hydrożel (Olfen Żel), 10 mg/g, żel, 100 g (tuba)

Cena: 34,69 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OLFEN
Opakowanie	100 g
Postać	Żel
Producent	TEVA B.V.
Przeznaczenie	Chłodzące, Przeciwbólowe, Przeciwoobrzękowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Olfen hydrożel to lek o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym, przeznaczony do leczenia urazów takich jak skręcenia, nadwyrężenia i stłuczenia, a także stanów zapalnych stawów i tkanek miękkich. Może być stosowany u młodzieży powyżej 14 lat i dorosłych. Dodatkowo, Olfen hydrożel wykazuje działanie chłodzące.

Wskazania

Olfen hydrożel stosuje się miejscowo (w zależności od wieku):

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat:

- pourazowe stany zapalne (ścięgna, więzadła, mięśnie stawy) - efekt skręceń, stłuczeń, nadwyrężeń,

ból (np. pleców),

- zapalenie ścięgien, łokieć tenisisty, zapalenie torebki stawowej, zapalenie okołostawowe lub inne ograniczone stany zapalne tkanek miękkich.

Dorośli:

- choroba zwyrodnieniowa stawów o łagodnym i ograniczonym charakterze.

Działanie

Olfen hydrożel zawiera diklofenak, który należy do grupy NLPZ - niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Diklofenak wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne. Olfen hydrożel wykazuje również działanie przeciwobrzękowe, chłodzące i kojące.

Dawkowanie

Dawkowanie: 3-4 razy na dobę od 2 do 4 g leku. Nie należy przekraczać dawki dobowej 15 g.

Skład

- Substancją czynną leku jest: diklofenak sodowy (Diclofenacum natricum).
- 1 g żelu zawiera 10 mg diklofenaku sodowego.
- Substancje pomocnicze: adypinian izopropylu, kwas mlekowy, alkohol izopropylowy, sodu pirosiarczyn, hydroksypropyloceluloza, hydroksyetyloceluloza, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Olfen hydrożel:

- w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na diklofenak lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; w przypadku uczulenia (gdy wystąpiła reakcja uczuleniowa - wysypka, trudności w oddychaniu) po zastosowaniu ASA (kwasy acetylosalicylowego), ibuprofenu lub innych leków stosowanych w bólu stawów i mięśni,
- u dzieci i młodzieży poniżej 14. roku życia,
- u kobiet w ciąży w okresie III trymestru

Działania niepożądane

W przypadku wystąpienia poniższych objawów, należy skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- pokrzywka,
- wysypka skórna (z pęcherzykami).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- uczucie ucisku w klatce piersiowej (astma), spłycony oddech, sapanie,
- obrzęk - ust, twarzy, języka, krtani.

Inne działania niepożądane.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- zaczerwienienie, pieczenie skóry,
- świąd, wysypka skórna.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- zwiększona wrażliwość skóry na promieniowanie słoneczne (możliwe objawy - świąd, obrzęk, pęcherze).

Ostrzeżenia

- Nie należy stosować żelu Olfen na otwarte rany, uszkodzoną skórę, wypryski. W przypadku wystąpienia wysypki skórnej, należy odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza.
- Nie należy stosować żelu na duże powierzchnie ciała ani długotrwale.
- Olfen hydrożel przeznaczony jest do stosowania wyłącznie na skórę. Nie stosować na błony śluzowe (np. w jamie ustnej) i należy unikać kontaktu z oczami.
- Nie należy stosować na miejsce zaaplikowane nieprzepuszczającego powietrza bandażu.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Producent

MERCKLE GMBH

Galeria

