

Olfen Patch Plastry lecznicze 140 mg, 5 sztuk

Cena: 64,51 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OLFEN
Opakowanie	5 plasterów
Postać	Plastry lecznicze
Producent	TEVA B.V.
Przeznaczenie	Ból, Mięśnie i stawy, Urazy
Rodzaj produktu	Lek
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Olfen Patch to lecznicze plastry stosowane miejscowo, które są używane w krótkotrwałej terapii do łagodzenia bólu związanego z nagłymi nadwyrężeniami, zwichnięciami lub stłuczeniami kończyn spowodowanymi tępyymi urazami.

Wskazania

- Nadwyrężenia
- Stłuczenia
- Tępe urazy

Działanie

Olfen Patch to lek łagodzący ból. Należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Olfen Patch stosowany jest miejscowo w krótkotrwałej terapii do łagodzenia bólu związanego z nagłymi nadwyrężeniami, zwichnięciami lub stłuczeniami w obrębie rąk i nóg powstałymi w następstwie tępych urazów.

Składniki

Substancją czynną leku jest: Diklofenak Sódowy. Każdy plaster leczniczy zawiera 140 mg Diklofenaku Sódowego. Ponadto lek zawiera: Makrogolu Eter Laurylowy (9EO), Diizopropylu Adypinian, Glicerol, Glikol propylenowy, Sorbitol ciekły krystalizujący (E 420), Sodu poliakrylan, Karmeloza sodowa, Metakrylanu butylu kopolimer zasadowy, Krzemionka koloidalna bezwodna, Kaolin lekki naturalny, Sodu siarczyny (E 221), Disodu edetynian, Butylohydroksytoluen (E 321), Glinu potasu siarczan, Kwas winowy, Lewomentol, Woda oczyszczona, Poliestrowa warstwa nośna (EL-8100S), Polipropylenowy film ochronny.

Stosowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zazwyczaj stosowana dawka:
Przyklejać plaster leczniczy na bolące miejsce dwa razy na dobę, rano i wieczorem. Można zastosować nie więcej niż dwa plastry



lecznicze na dobę, nawet jeżeli urazy występują w kilku miejscach. Jednocześnie stosować tylko na jedno bolące miejsce. Lek Olfen Patch należy stosować jedynie na nienaruszoną, niezmienioną chorobowo skórę

Przeciwwskazania

- Jeżeli pacjent ma uczulenie na diklofenak, glikol propylenowy, butylohydroksytoluen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- Jeżeli pacjent ma uczulenie na jakikolwiek inny niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ, np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen)
- Jeżeli zażywanie przez pacjenta kwasu acetylosalicylowego lub innego leku z grupy NLPZ wywoływało napady astmy, obrzęk skóry lub obrzęk i podrażnienie wewnątrz nosa
- Jeżeli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy
- Na rany lub otwarte uszkodzenia skóry (np. otarcia, skaleczenia, oparzenia), w przypadku infekcji skórnych lub egzemy
- Podczas trzech ostatnich miesięcy ciąży

Producent

TEVA