

Olfen Żel, 10 mg/g, żel, 50 g

Cena: 23,60 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OLFEN
Opakowanie	50 g
Postać	Żel
Producent	TEVA B.V.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwpalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 14 lat

Opis produktu

Opis

Olfen Żel to lek do stosowania na skórę, zawierający diklofenak, który jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania u młodzieży powyżej 14 lat oraz dorosłych, w przypadku stanów zapalnych ścięgien, mięśni i stawów.

Wskazania

Młodzież powyżej 14 lat - leczenie krótkotrwałe:

- miejscowe, objawowe leczenie bólu towarzyszącego nadwyrężeniom, skręceniom lub stłuczeniom na skutek tępych urazów.

Dorośli:

- pourazowe stany zapalne ścięgien, więzadeł, mięśni i stawów przy skręceniach, nadwyrężeniach lub stłuczeniach,

bóle pleców,

- ograniczone stany zapalne tkanek miękkich, typu zapalenie ścięgien czy łokieć tenisisty,
- ograniczone i łagodne postaci choroby zwyrodnieniowej stawów.

Działanie

Olfen żel działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie. Ponadto, ze względu na wodno-alkoholowe podłoże żel wykazuje również działanie kojące i chłodzące.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: 3 lub 4 razy na dobę należy delikatnie rozsmarować odpowiednią ilość żelu w chorobowo zmienione

miejsce.

Skład

- Substancją czynną leku jest diklofenak sodowy (Diclofenacum natricum).
- 1 g żelu zawiera sól sodowa 10 mg diklofenaku sodowego.
- Substancje pomocnicze: adypinian izopropylu, kwas mlekowy, alkohol izopropylowy, sodu pirosiarczyn, hydroksypropyloceluloza, hydroksyetyloceluloza, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Olfen żel:

- u pacjentów uczulonych na diklofenak lub którykolwiek ze składników leku,
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiła reakcja uczuleniowa (np. wysypka, trudności w oddychaniu lub napad kaszlu) po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, lub po innych lekach używanych w leczeniu bólu stawów i mięśni,
- w trzecim trymestrze ciąży,
- na otwarte rany, uszkodzoną skórę, wypryski,
- u dzieci poniżej 14 lat.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- wysypka skórna, świąd, zaczerwienienie lub pieczenie skóry.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- skórna z pęcherzykami, pokrzywka.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- sapanie, spłycony oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej (astma),
- obrzęk twarzy, ust, języka lub krtani,
- zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne (oparzenia słoneczne ze świądem, obrzękiem i pęcherzami).

Ostrzeżenia

- Należy unikać stosowania leku na duże powierzchnie skóry przez długi okres czasu, jeśli nie zostało to zlecone przez lekarza.
- Olfen żel jest przeznaczony do użytku zewnętrznego. Nie należy go stosować w jamie ustnej. Należy unikać kontaktu żelu z oczami.
- Jednoczesne bandażowanie zwykle stosowane w przypadku skręceń może być stosowane, ale nie mogą to być nieprzepuszczające powietrza bandaż.

Producent

TEVA B.V.
Swensweg 5, Holandia
Haarlem

Galeria

