

Omeprazole Genoptim SPH, 20 mg, 14 kapsułek

Cena: 8,81 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	14 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Zmniejsza ilość kwasu solnego
Rodzaj produktu	Produkt leczniczy
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Omeprazole zmniejsza ilość kwasu solnego wydzielanego w żołądku. Lek stosowany jest w leczeniu refluksu u osób dorosłych.

Wskazania

Produkt leczniczy Omeprazole Genoptim SPH jest wskazany w leczeniu objawów refluksu (np. zgagi czy zarzucania treści żołądkowej) u osób dorosłych.

Działanie

Lek Omeprazole Genoptim SPH zawiera substancję czynną omeprazol, która należy do grupy leków nazywanych inhibitorami pompy protonowej. Działanie tych leków polega na zmniejszaniu ilości kwasu solnego wydzielanego w żołądku.

Dawkowanie

Zalecana dawka to 10 mg - 20 mg raz na dobę przez 14 dni. Jeśli po tym okresie objawy nie ustąpią należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystarczającej do leczenia dawki 10 mg należy zastosować inny lek, umożliwiający takie dawkowanie.

Skład

- Każda kapsułka zawiera: 20 mg omeprazolu.
- Substancje pomocnicze: sacharoza, ziarenka, laktoza bezwodna, hypromeloza, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, disodu fosforan dwunastowodny, hypromelozy ftalan, dietylu ftalan.
- Kapsułka żelatynowa twarda: żelatyna, indygotyna (E132), żółcień chinolinowa (E104).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, podstawione benzoimidazole lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):

- ból głowy;
- wpływ na żołądek lub jelita: biegunka, ból żołądka, zaparcia, gazy (wzdęcia), łagodne polipy żołądka;
- nudności lub wymioty.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):

- obrzmienie stóp i kostek;
- zaburzenia snu (bezsenność);
- zawroty głowy, uczucie mrowienia i kłucia, uczucie senności;
- odczucie wirowania (zawroty głowy);
- zmiany w wynikach badań czynności wątroby;
- wysypka, wysypka grudkowata (pokrzywka) oraz świąd skóry;
- ogólne złe samopoczucie oraz brak energii.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

- zmiany w wynikach badań krwi, takie jak zmniejszona liczba krwinek białych lub płytek krwi, co może powodować osłabienie, łatwiejsze siniaczenie lub zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zakażeń;
- reakcje alergiczne, niekiedy bardzo ciężkie, obejmujące obrzmienie warg, języka i gardła, gorączkę, świszczący oddech;
- małe stężenie sodu we krwi. Może to prowadzić do osłabienia, wymiotów i kurczów mięśniowych;
- uczucie pobudzenia, splątania lub przygnębienia;
- zmiana odczuwania smaku;
- zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie;
- nagle występujący świszczący oddech lub zadyszka (skurcz oskrzeli);
- suchość w jamie ustnej;
- zapalenie błony śluzowej jamy ustnej;
- zakażenie grzybicze jelit (pleśniawki);
- zaburzenia wątroby, w tym żółtaczkę, które mogą powodować zażółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu oraz zmęczenie;
- wypadanie włosów (łysienie);
- wysypka skórna podczas ekspozycji na słońce;
- bóle stawów (artralgia) lub bóle mięśni (myalgia);
- ciężkie choroby nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek);
- zwiększona potliwość.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):

- zmniejszenie liczby krwinek, w tym spadek liczby białych krwinek lub ich brak (agranulocytoza);
- agresja;
- widzenie, odczuwanie lub słyszenie rzeczy nieistniejących (omamy);

Ostrzeżenia

Omeprazole Genoptim SPH może powodować utajenie objawów innych chorób. Z tego względu, jeżeli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów przed rozpoczęciem lub w trakcie przyjmowania leku Omeprazole Genoptim SPH, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

- nieuzasadniona utrata masy ciała oraz utrudnione połykanie;
- ból żołądka lub niestrawność;
- wymioty treścią pokarmową lub krwią;
- smoliste stolce (obecność krwi w kale);
- ciężka lub uporczywa biegunka (stosowanie omeprazolu powoduje nieznaczne zwiększenie występowania biegunki zakaźnej);
- jeśli pacjent miał chorobę wrzodową żołądka lub zabiegi chirurgiczne w obrębie przewodu pokarmowego;
- jeśli pacjent stosuje leki na niestrawność i zgagę przez okres dłuższy niż 4 tygodnie;
- jeśli pacjent niestrawność lub zgagę utrzymuje się u pacjenta przez okres dłuższy niż 4 tygodnie;
- jeśli pacjent ma żółtaczkę lub inną ciężką chorobę;
- jeśli pacjent jest w wieku powyżej 55 lat i w ostatnim czasie wystąpiły u niego nowe dolegliwości.

Producent

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

02-255 Warszawa