

Opokan Lek przeciwzapalny i przeciwbólowy 10 sztuk

Cena: 8,50 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OPOKAN
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwzapalne
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 15 lat

Opis produktu

Opis

Opokan to preparat leczniczy o właściwościach przeciwbólowych i przeciwzapalnych, zalecany w przypadku dolegliwości bólowych związanych z chorobami reumatycznymi, takimi jak bóle kostne, stawowe i mięśniowe. Meloksycam, będący składnikiem leku, należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Preparat jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 15. roku życia.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów (choroba reumatyczna o podłożu immunologicznym), młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, w bólach kostno-stawowych i mięśniowych (np. bóle kręgosłupa, pleców, kolan) w przebiegu chorób reumatoidalnych i zwyrodnieniowych stawów.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dorośli: 1 tabletka dziennie.

Skład

1 tabletka zawiera: substancję czynną: meloksycam 7,5mg oraz substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia żelowana, skrobia kukurydziana, sodu cytrynian, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Opokan:

- u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną czy inne lek z grupy NLPZ (np. kwas acetylosalicylowy) lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
- jeśli podczas przyjmowania innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. kwasu acetylosalicylowego) wystąpiły napady duszności bądź astmy, pokrzywka, polipy nosa lub obrzęk naczynioruchowy,
- Jeśli u pacjenta występuje: ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek i pacjent nie jest leczony dializami, ciężka niewydolność serca,
- u osób z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy (u którego wystąpiły co najmniej dwa epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia),
- jeśli pacjent miał wylew krwi do mózgu lub inne krwawienia np. z przewodu pokarmowego.

Działania niepożądane

- Nudności, wymioty, bóle brzucha, wzdęcia,
- Zaparcia, biegunka,
- Niedokrwistość,
- Uczucie pustki w głowie,

Ostrzeżenia

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice

Galeria

