

Orofar Junior (Orofar Total Action), tabletki do ssania, 24 tabletki

Cena: 33,84 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OROFAR
Opakowanie	24 tabletki
Postać	Tabletki do ssania
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Antyseptyczne, odkażające, Przeciwbakteryjne, Przeciwbólowe, Przeciwgrzybicze
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Orofar Junior to lek przeznaczony do leczenia infekcji oraz bólu gardła, krtani i jamy ustnej. Produkt ten działa na dwa sposoby - zawiera substancję dezynfekującą (chlorek benzoksoniowy) oraz substancję miejscowo znieczulającą (chlorowodorek lidokainy). Tabletki Orofar Junior do ssania są odpowiednie zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci powyżej 6. roku życia.

Wskazania

Orofar Junior stosuje się w:

- grzybiczych, wirusowych lub bakteryjnych zakażeniach gardła;
- stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej - afty (zakażenia jamy ustnej),
- pomocniczo w leczeniu zapalenia migdałków (anginy),
- łagodzeniu bólu, który występuje przy przeziębieniu, zapaleniu gardła, krtani.

Działanie

Orofar Junior zawiera dwie substancje czynne o kompleksowym działaniu:

- chlorek benzoksoniowy - jest substancją antyseptyczną, działa na bakterie, wirusy i grzyby wywołujące zakażenia gardła oraz jamy ustnej,
- chlorowodorek lidokainy - to miejscowo znieczulający składnik, dzięki czemu lek łagodzi ból gardła.

Dawkowanie

- Dzieci powyżej 6 lat: co dwie - trzy godziny należy powoli ssać 1 tabletkę.

Maksymalna dawka dobową u dzieci wynosi 6 tabletek w ciągu doby.

- Dorośli: co dwie - trzy godziny należy powoli ssać 1 tabletkę. W przypadku nasilonego zakażenia dawkę można zwiększyć do jednej tabletki co jedną lub dwie godziny.

Nie należy stosować więcej niż 10 tabletek w ciągu doby.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: chlorek benzoksoniowy (Benzoxonii chloridum) i chlorowoderek lidokainy (Lidocaini hydrochloridum).
- 1 tabletkę zawiera 1 mg chlorku benzoksoniowego oraz 1 mg chlorowodoru lidokainy.
- Substancje pomocnicze: sorbitol, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 6000, skrobia kukurydziana, sacharyna sodowa, sodu chlorek, kwas cytrynowy jednowodny, aromat pomarańczowy, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Orofar Junior:

- jeśli pacjent jest uczulony na: chlorek benzoksoniowy lub inne czwartorzędowe sole amoniowe czy chlorowoderek lidokainy lub inne miejscowo znieczulające leki amidowe, albo którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- podrażnienie lub mrowienie w jamie ustnej lub gardle.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- trudności w oddychaniu lub przełykaniu,
- opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła,
- silny świąd skóry z czerwoną wysypką i pęcherzami.


Ostrzeżenia

- Nie stosować u osób z tendencją do zachłystywania, zwłaszcza u osób w wieku poniżej sześciu lub powyżej 60 lat.
- Podczas stosowania leku Orofar Junior należy zachować ostrożność w przypadku występowania ran lub zmian w jamie ustnej i błonie śluzowej gardła.
- Orofar Junior zawiera sorbitol (E420), więc jeśli stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Producent

NOVARTIS CONSUMER
Marynarska 15
Warszawa

Galeria



24 tabletki

0000000000