

Orofar MAX, 2 mg + 1 mg, pastylki twarde, 20 pastylek

Cena: 38,80 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OROFAR
Opakowanie	20 pastylek
Postać	Pastylki twarde
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Antyseptyczne, odkażające, Przeciwbólowe, Przeciwgrzybicze, Przeciwwirusowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Orofar Max to lek zawierający dwie aktywne substancje o wszechstronnym działaniu. Jedna działa dezynfekująco, podczas gdy druga zapewnia miejscowe znieczulenie. Lek ten jest przeznaczony do krótkotrwałego, miejscowego leczenia stanów zapalnych oraz bólu gardła i jamy ustnej. Efekt łagodzenia bólu gardła pojawia się w ciągu dwóch minut od zażycia. Orofar Max może być stosowany przez dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia.

Wskazania

Miejscowe leczenie:

- bólu gardła,
- stanu zapalnego jamy ustnej,
- podrażnienia wynikającego z powyższych dolegliwości.

Działanie

Orofar MAX zawiera dwie substancje czynne:

- chlorek cetylpyridyniowy - substancja odkażająca, działająca bakteriobójczo, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo;
- chlorowodorek lidokainy - posiada właściwości znieczulające, łagodzące ból.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 pastylka co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu.

Nie stosować więcej niż 3 pastylki na dobę.

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 1 lub 2 godziny w zależności od nasilenia bólu.

Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 2 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu.

Nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są: cetylopirydyniowy chlorek i lidokainy chlorowodorek (Cetylpyridinii chloridum, Lidocaini hydrochloridum).
- Jedna pastylka twarda Orofar MAX zawiera 2 mg cetylopirydyniowego chlorku i 1 mg lidokainy chlorowodorku.
- Substancje pomocnicze: olejek miętowy z liści mięty pieprzowej, olejek miętowy Schimmela, lewomentol, acesulfam potasowy, skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy jednowodny, makrogl 6000, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sorbitol.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Orofar MAX:

- jeśli pacjent ma uczulenie na cetylopirydyniowy chlorek, lidokainy chlorowodorek czy inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 1000 osób):

- nudności,
- podrażnienie jamy ustnej, podrażnienie gardła.

Bardzo rzadko występujące działanie niepożądane (u 1 na 10000 osób):

- wysypka skórna.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Orofar MAX należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w przypadku gdy:

- ból gardła utrzymuje się przez kilka dni i pacjent ma gorączkę,
- ból gardła utrzymuje się po 5 dniach stosowania leku lub jeśli towarzyszy mu wysoka gorączka, zawroty głowy lub wymioty.

Producent

NOVARTIS CONSUMER
Marynarska 15
Warszawa

Galeria

