

Ortanol Max, 20 mg, kapsułki dojelitowe twarde, 14 kapsułek

Cena: 8,80 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	14 kapsułek
Postać	Kapsułki dojelitowe twarde
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Kwaśne odbijanie, Zgaga
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Ortanol Max to lek z grupy inhibitorów pompy protonowej, który zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku. Stosuje się go w krótkotrwałym łagodzeniu objawów refluksu żołądkowo przełykowego, takich jak zgaga, cofanie treści żołądkowej czy kwaśne odbijanie. Preparat ma postać kapsułek dojelitowych i jest dostępny bez recepty.

Wskazania

Lek Ortanol Max stosowany jest w w krótkotrwałym leczeniu objawów refluksu żołądkowo-przełykowego.

Działanie

Ortanol Max to produkt leczniczy zawierający omeprazol, który należy do inhibitorów pompy protonowej. Omeprazol zmniejsza ilość wydzielanego kwasu solnego w żołądku poprzez wpływ na komórki okładzinowe żołądka, które są odpowiedzialne za produkcję kwasu solnego. Hamowanie komórek okładzinowych jest odwracalne.

Dawkowanie

Dorośli: zwykle stosuje się 1 kapsułkę (20 mg) raz na dobę przez 14 dni.

Skład

- Substancją czynną leku jest: omeprazol (Omeprazolum).
- Każda kapsułka dojelitowa, twarda, zawiera 20 mg omeprazolu.
- Substancje pomocnicze: Granulki: sacharoza, ziarenka, hypromeloza, powidon K25 sodu laurylosiarczan, magnezu tlenek

ciężki, talk, kwasu metakrylowego i etyloakrylanu kopolimer 1:1, dyspersja 30%, trietylu cytrynian, magnezu stearynian. Kapsułka: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171).

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Ortanol Max, jeśli pacjent: ma nadwrażliwość na substancję czynną - omeprazol lub którykolwiek z

pozostałych składników tego leku; ma uczulenie na pozostałe leki z grupy inhibitorów pompy protonowej (pantoprazol, lanzoprazol, rabeprazol, ezomeprazol); przyjmuje nelfinawir.

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): bóle głowy; nudności, wymioty, biegunka, ból żołądka; zaparcie, wzdęcie; łagodne polipy żołądka.
- Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): zaburzenia snu; zawroty głowy, senność; uczucie mrowienia; wysypka skórna; złe samopoczucie.
- Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi (co może powodować osłabienie, powstawanie siniaków lub łatwiejszy rozwój zakażeń); pobudzenie, splątanie, depresja; zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia; suchość w jamie ustnej; zaburzenia czynności wątroby; ciężkie zaburzenia czynności nerek; wypadanie włosów; zwiększona potliwość; wysypka skórna w wyniku narażenia na promienie słoneczne; ból stawów lub mięśni.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): zmiany w morfologii krwi; agresja; omamy; osłabienie mięśni; powiększenie piersi u mężczyzn.
- Częstość nieznana: zmniejszenie stężenia magnezu, któremu może towarzyszyć zmniejszenie stężenia potasu i/lub wapnia; mikroskopowe zapalenie jelita grubego; wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów.

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku grupy inhibitorów pompy protonowej z omeprazolem dłuższe niż 14 dni wymaga konsultacji z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia poniższych objawów, należy skonsultować się z lekarzem: nieuzasadniona utrata masy ciała;

wymioty (krwawe); smoliste stolce; uporczywa biegunka; żółtaczka.

- Stosowanie leku Ortanol Max na nadkwaśność należy koniecznie omówić z lekarzem jeśli w przeszłości wystąpiła wysypka skórna po zastosowaniu leku podobnego do Ortanol Max (np. z grupy inhibitorów pompy protonowej, zawierającego omeprazol)

- Leku Ortanol Max nie należy stosować zapobiegawczo.
- Ortanol MAX zawiera sacharozę i sól.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.
- Lek Ortanol Max na zgagę i refluks należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Producent

SANDOZ
Domaniewska 50c
Warszawa