

OST 20 mg/ 2 ml, roztwór do iniekcji, 2 ml x 1 ampułkostrzykawka

Cena: 191,77 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OST
Opakowanie	1 ampułkostrzykawka
Postać	Ampułkostrzykawka
Producent	TRB CHEMEDICA AG
Przeznaczenie	Wzmocnienie stawów
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Roztwór wiskoelastyczny do iniekcji do przestrzeni stawowej OST to specjalistyczny wyrób medyczny przeznaczony do łagodzenia bólu i poprawy ruchomości stawów, które mogą być ograniczone z powodu urazów lub choroby zwyrodnieniowej. Ampułkostrzykawka OST 20 mg/2 ml zawiera 2 ml roztworu z 1% kwasem hialuronowym, pozyskiwanym metodą biofermentacji, bez białek zwierzęcych. Struktura kwasu hialuronowego w preparacie jest podobna do tej występującej naturalnie w ludzkim organizmie.

Składniki

1 ml izotonicznego roztworu zawiera:

- 10,0 mg soli sodowej kwasu hialuronowego oraz chlorek sodu, wodorofosforan sodu, dwuwodorofosforan sodu, wodę do iniekcji.

Zastosowanie

Ból oraz ograniczona ruchomość stawu kolanowego i innych stawów maziówkowych w przebiegu zmian degeneracyjnych i pourazowych.

Sposób użycia

- 3-5 iniekcji do stawu w odstępach jednotygodniowych.
- Jednocześnie może być leczonych kilka stawów.
- W zależności od stopnia zaawansowania choroby korzystny efekt cyklu pięciu iniekcji dostawowych utrzymuje się co najmniej 6 miesięcy.
- W razie potrzeby można kurację powtórzyć.
- W przypadku wysięgu w stawie wskazane jest jego zmniejszenie poprzez aspirację, odpoczynek, okład z lodu i/lub dostawową

iniekcję kortykosterydu.

Leczenie może być rozpoczęte po 2-3 dniach.

- Zawartość i zewnętrzna powierzchnia ampułkostrzykawki jest jałowa tak długo, jak sterylne opakowanie pozostaje nieuszkodzone.
- Wyjąć ampułkostrzykawkę z jałowego opakowania, odkręcić osłonkę z końcówki luer lock, zamocować odpowiednią igłę (np. 19 do 21G) i zatrzasknąć, lekko obracając.
- Jeśli w strzykawce znajduje się pęcherzyk powietrza należy go usunąć przed iniekcją.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na którykolwiek składnik preparatu.
- Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także w chorobach zapalnych stawów jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Bechterewa.

Ostrzeżenia

- OST jest wyrobem medycznym wyłącznie do użytku lekarza.
- Nie używać, jeżeli ampułkostrzykawka lub sterylne opakowanie zostały uszkodzone.

Ważne wskazówki

- Ampułkostrzykawka OST to produkt jednorazowego użycia.
- Przed użyciem należy przeczytać ulotkę informacyjną.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej, od 2 do 25°C.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać po upływie terminu ważności.

Producent

TRB CHEMEDICA AG
Richard-Reitzner-Allee 1
85540 Haar/ Munich, Niemcy