

Otinum, 20% (200 mg/g), krople do uszu, 10 g



Cena: 38,64 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OTINUM
Opakowanie	10 g
Postać	Krople
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Przeznaczenie	Ból, Zapalenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Krople do uszu **Otinum** łagodzą ból i stan zapalny. Mogą być stosowane doraźnie w przypadku zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego, objawiającego się bólem, świądem i zaczerwienieniem. Są także wskazane do zmiękczenia stwardniałej woskowiny przed płukaniem przewodu słuchowego zewnętrznego. Otinum to bez recepty krople do uszu o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.

Wskazania

Lek wskazany do stosowania doraźnego w stanach zapalnych zewnętrznego przewodu słuchowego objawiających się bólem, świądem, zaczerwienieniem. Lek zalecany jest także do zmiękczenia woskowiny przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego.

Działanie

Substancją czynną leku Otinum w postaci kropli do uszu jest pochodna kwasu salicylowego - salicylan cholin. Salicylan cholin stosowany miejscowo ma właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Dzięki temu zmniejsza ból oraz stan zapalny w przebiegu zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego. Zawarty w leku glicerol zmiękcza woskowinę w uchu, co ułatwia jej usuwanie.

Dawkowanie

W celu krótkotrwałego leczenia miejscowych objawów ostrego zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego: zwykle od 3 do 4 kropli do przewodu słuchowego zewnętrznego co 6 do 8 godzin. Bez zalecenia lekarza, nie należy stosować leku Otinum dłużej niż 3 dni.

Skład

- Substancją czynną leku jest salicylan cholin.
- 1 g kropli zawiera 0,2 g salicylanu cholin (Cholini salicylas).
- Pozostałe składniki to: glicerol, etanol 96%, chlorobutanol półwodny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Otinum w przypadku: nadwrażliwości na substancję czynną, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję



pomocniczą; wcześniejszego rozpoznania uszkodzenia błony bębenkowej; krwawienia lub wycieku wydzieliny z ucha; występowania silnego bólu ucha wraz z pogorszeniem słuchu; wieku poniżej 18 lat.

Działania niepożądane

Miejscowe reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie i świąd skóry).

Ostrzeżenia

- W przypadku wystąpienia nawrotów choroby o zastosowaniu kropli do uszu Otinum powinien zdecydować lekarz. Leczenie za pomocą produktu Otinum jest leczeniem objawowym. Lek Otinum może maskować objawy innych chorób uszu i utrudnić lub opóźnić ich prawidłowe rozpoznanie. Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku.
- Wystąpienie dodatkowych objawów (gorączka, wyciek z ucha) lub podejrzenie obecności ciała obcego w przewodzie słuchowym jest wskazaniem do konsultacji z lekarzem.
- Lek zawiera konserwant - chlorobutanol półwodny.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

Bausch Health Ireland Limited
Lake Drive Citywest Business
3013 Campus Dublin 24, D24PPT3 Irlandia