

Otinum, 20% (200 mg/g), krople do uszu, 10 g



Cena: 36,84 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 g (but.)
Postać	Krople do uszu
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Lek Otinum jest przeznaczony do doraźnego stosowania w przypadku stanów zapalnych zewnętrznego przewodu słuchowego, które objawiają się bólem, świądem i zaczerwienieniem. Ponadto, zaleca się go do zmiękczenia woskowiny przed płukaniem przewodu słuchowego.

Wskazania

Lek wskazany do stosowania doraźnego w stanach zapalnych zewnętrznego przewodu słuchowego objawiających się bólem, świądem, zaczerwienieniem. Lek zalecany jest także do zmiękczenia woskowiny przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego.

Działanie

Substancją czynną leku Otinum w postaci kropli do uszu jest pochodna kwasu salicylowego - salicylan choliny. Salicylan choliny stosowany miejscowo ma właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Dzięki temu zmniejsza ból oraz stan zapalny w przebiegu zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego. Zawarty w leku glicerol zmiękcza woskowinę w uchu, co ułatwia jej usuwanie.

Dawkowanie

Zalecane dawkowanie to:

- W celu krótkotrwałego leczenia miejscowych objawów ostrego zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego: zwykle od 3 do 4 kropli do przewodu słuchowego zewnętrznego co 6 do 8 godzin. Bez zalecenia lekarza, nie należy stosować leku Otinum dłużej niż 3 dni.
- W celu zmiękczenia stwardniałej woskowiny przed jej usunięciem z ucha: Zwykle od 3 do 4 kropli do przewodu słuchowego zewnętrznego co 12 godzin przez cztery dni.

Skład

- Substancją czynną leku jest salicylan choliny.
- Pozostałe składniki to: glicerol, etanol 96%, chlorobutanol półwodny, woda oczyszczona.



Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Otinum:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (salicylan choliny), inne salicylany (np. kwas acetylosalicylowy/aspiryna) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeżeli u pacjenta występuje krwawienie lub wyciek z ucha;
- jeżeli pacjent odczuwa silny ból ucha wraz z pogorszeniem słuchu;
- jeśli u pacjenta wcześniej rozpoznano uszkodzenie błony bębenkowej (pęknięcie lub przerwanie jej ciągłości).
- u osób w wieku poniżej 18 lat

Ostrzeżenia

- Lek Otinum może maskować objawy innych chorób uszu i utrudnić lub opóźnić ich prawidłowe rozpoznanie. Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku.
- Lek zawiera konserwant - chlorobutanol półwodny.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

PHARMASWISS CZEKA REPUBLIKA
Jankovcova 1569/2c
Praga, Republika Czeska