

Otinum krople d/uszu 10 g



Cena: 31,80 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OTINUM
Opakowanie	10 g
Postać	Krople
Producent	PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.
Przeznaczenie	Ból, Zapalenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Lek ten zawiera salicylan choliny jako substancję czynną, która ma działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Dodatkowo gliceryna, będąca składnikiem leku, pomaga zmiękczyć woskowinę, co ułatwia jej usunięcie.

Otinum jest przeznaczony do stosowania miejscowego, bezpośrednio w uchu. Działa on tylko w miejscu aplikacji i nie wykazuje działania ogólnoustrojowego. Lek ma na celu zwalczanie bólu oraz łagodzenie stanów zapalnych w uchu.

Otinum może być stosowany w przypadku nadmiernej ilości woskowiny w uchu, która może powodować uczucie zatkania lub dyskomfortu, a także w przypadku zapalenia ucha zewnętrznego.

Wskazania

Lek wskazany do stosowania doraźnego w stanach zapalnych zewnętrznego przewodu słuchowego objawiających się bólem, świądem, zaczerwienieniem. Lek zalecany jest także do zmiękczenia woskowiny przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego.

Działanie

Krople wykazują miejscowe działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Dawkowanie

- Dorośli w zapaleniu ucha środkowego, błony bębenkowej oraz przewodu słuchowego zewnętrznego: 3-4 krople, do przewodu słuchowego zewnętrznego, 3-4 razy na dobę.
- Dorośli w celu zmiękczenia stwardniałej woskowiny: 3-4 krople, do przewodu słuchowego zewnętrznego, 2 razy na dobę przez 4 dni.
- Osoby w wieku podeszłym lub z zaburzeniami czynności wątroby i nerek: nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Skład

1 g preparatu Otinum krople do uszu zawiera:

- substancję czynną: choliny salicylan 0,2 g,
- substancje pomocnicze: glicerol, etanol 96%, chlorobutanol półwodny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Otinum nie powinno być stosowane przez osoby, u których stwierdzono uczulenie na choliny salicylan, inne salicylany lub jakikolwiek inny składnik tego leku. W przypadku znanej nadwrażliwości na te substancje może wystąpić reakcja alergiczna, która może być niebezpieczna dla zdrowia.

Dodatkowo, Otinum nie powinno być używane, jeśli występuje perforacja (pęknięcie) błony bębenkowej. Zastosowanie kropli do uszu w takiej sytuacji może spowodować wniknięcie substancji do ucha środkowego, co może prowadzić do powikłań i pogorszenia stanu zdrowia.

Działania niepożądane

- Miejscowe reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie i świąd skóry).
- U osób z perforacją błony bębenkowej w trakcie stosowania leku może dojść do uszkodzenia słuchu.

Ostrzeżenia

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku Otinum lub doświadczania niepożądanych skutków ubocznych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Należy zawsze przestrzegać zaleconych dawek leku przez lekarza. Nie stosuj większych dawek niż zalecane, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych skutków ubocznych.
- Lek Otinum jest przepisywany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym osobom, nawet jeśli mają podobne objawy. Każdy pacjent może mieć indywidualne warunki zdrowotne i unikalne potrzeby terapeutyczne.
- Jeśli przypadkowo zostanie przyjęta większa niż zalecana dawka leku Otinum, mogą wystąpić poważne objawy, takie jak dezorientacja, zawroty głowy, wymioty, nadmierna potliwość, dzwonienie w uszach i zbyt intensywne oddychanie. W przypadku przyjęcia bardzo dużej dawki leku, mogą wystąpić poważne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, oddychania i krążenia krwi.
- W razie przypadkowego przedawkowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania pomocy i porady

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.