

# Otinum krople do uszu 10g IR



Cena: 27,25 zł

## Opis słownikowy

Część ciała	Uszy
Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OTINUM
Opakowanie	10 g (but.)
Postać	Krople
Producent	DELFARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ból, Zapalenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

## Opis produktu

### Opis

**Otinum** to lek stosowany w postaci kropli do uszu. Jego substancją czynną jest salicylan choliny, który wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. Głównym zastosowaniem Otinum jest łagodzenie bólu oraz redukcja stanu zapalnego w uchu. Otinum działa miejscowo, co oznacza, że jego działanie ogranicza się do bezpośredniego obszaru, w którym został zastosowany. Lek nie działa ogólnoustrojowo, czyli nie wpływa na cały organizm.

### Wskazania

Krople do uszu Otinum 0,2 g/g (10 g) są przeznaczone do stosowania miejscowego w dwóch sytuacjach:

- W przypadku ostrych stanów zapalnych ucha środkowego, błony bębenkowej lub przewodu słuchowego zewnętrznego: Otinum działa miejscowo, przynosząc ulgę w bólu i redukując stan zapalny. Jest stosowany do łagodzenia objawów zapalenia w okolicy ucha. Należy skonsultować się z lekarzem w celu określenia odpowiedniej dawki i czasu trwania leczenia.
- Do zmiękczenia zatwardziałej woskowiny przed usunięciem: Otinum jest również stosowany jako pomocniczy środek w zmiękczeniu i ułatwianiu usunięcia nadmiaru woskowiny z ucha. Gliceryna zawarta w preparacie pomaga zmiękczyć woskowinę, ułatwiając jej usunięcie przez lekarza lub innego specjalistę.

### Działanie

Krople wykazują miejscowe działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

### Dawkowanie

Lek Otinum krople do uszu należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

- Dorośli w zapaleniu ucha środkowego, błony bębenkowej oraz przewodu słuchowego zewnętrznego: 3-4 krople, do przewodu

śluchowego zewnętrznego, 3-4 razy na dobę.

- Dorośli w celu zmiękczenia stwardniałej woskowiny: 3-4 krople, do przewodu słuchowego zewnętrznego, 2 razy na dobę przez 4 dni.
- Osoby w wieku podeszłym lub z zaburzeniami czynności wątroby i nerek: nie ma potrzeby zmiany dawkowania.

Krople Otinum 10 g przeznaczone są wyłącznie do podawania do ucha. Nie należy stosować ich doustnie.

#### Skład

1 g preparatu Otinum krople do uszu zawiera:

substancję czynną: choliny salicylan 0,2 g,

substancje pomocnicze: glicerol, etanol 96%, chlorobutanol półwodny, woda oczyszczona.

#### Przeciwwskazania

Nie zaleca się stosowania leku Otinum u pacjentów, którzy mają stwierdzone uczulenie (nadwrażliwość) na choliny salicylan, inne salicylany lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Jeśli pacjent ma historię uczulenia na te substancje, należy unikać stosowania Otinum.

Dodatkowo, krople Otinum nie powinny być stosowane w przypadku perforacji (pęknięcia) błony bębenkowej.

#### Działania niepożądane

- Otinum może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich pacjentów.
- Częstość występowania nieznanymi działaniami niepożądanymi (nie można określić na podstawie dostępnych danych) obejmuje możliwość wystąpienia miejscowych reakcji nadwrażliwości, takich jak zaczerwienienie i świąd skóry w miejscu zastosowania leku.
- W przypadku nasilenia się objawów niepożądanych opisanych w ulotce leku lub wystąpienia jakichkolwiek innych niewymienionych objawów niepożądanych, należy skonsultować się z lekarzem.
- Warto również pamiętać, że u osób z perforacją (pęknięciem) błony bębenkowej istnieje ryzyko uszkodzenia słuchu. W takiej sytuacji konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem w celu oceny i odpowiedniego leczenia problemu ucha.

#### Ostrzeżenia

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania leku Otinum lub doświadczenia niepożądanych skutków ubocznych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
- Należy zawsze przestrzegać zaleconych dawek leku przez lekarza. Nie stosuj większych dawek niż zalecane, ponieważ może to prowadzić do niebezpiecznych skutków ubocznych.
- Lek Otinum jest przepisywany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym osobom, nawet jeśli mają podobne objawy. Każdy pacjent może mieć indywidualne warunki zdrowotne i unikalne potrzeby terapeutyczne.
- Jeśli przypadkowo zostanie przyjęta większa niż zalecana dawka leku Otinum, mogą wystąpić poważne objawy, takie jak dezorientacja, zawroty głowy, wymioty, nadmierna potliwość, dzwonienie w uszach i zbyt intensywne oddychanie. W przypadku przyjęcia bardzo dużej dawki leku, mogą wystąpić poważne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, oddychania i krążenia krwi.
- W razie przypadkowego przedawkowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w celu uzyskania pomocy i porady

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.