

Otrex 600, 600 mg, tabletki, 30 tabletek

Cena: 38,43 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Uszczelniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Otrex 600 to preparat stosowany w celu poprawy napięcia ścian naczyń żylnych. Zalecany jest w przypadku dolegliwości takich jak uczucie ciężkości czy ból nóg, a także w terapii objawowej nasilonych symptomów żylaków odbytu.

Wskazania

Stosuje się, aby złagodzić objawy związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych, np: uczucia ciężkości nóg, bólów nóg oraz dolegliwości spowodowanych odleżynami. Wskazaniem do zastosowania Ortex 600 jest leczenie objawowe w przypadku zaostrzenia dolegliwości ze strony żylaków odbytu.

Działanie

Działanie leku Ortex 600 polega na zwiększeniu napięcia ścian naczyń żylnych i normalizacji przepuszczalności naczyń. Ortex 600 poprawia wytrzymałość małych naczyń krwionośnych.

Dawkowanie

Dawkowanie leku zależy od schorzenia. W przypadku niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych zwykle jest to 1 tabletkę na dobę, rano, na czczo.

W terapii zaostrzonych dolegliwości ze strony żylaków odbytu zazwyczaj stosowana dawka leku to 2 do 3 tabletek na dobę, w trakcie posiłków.

Skład

- Substancją czynną leku jest diosmina półsyntetyczna (Diosminum).
- 1 tabletkę zawiera 600 mg diosminy półsyntetycznej.
- Substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, powidon, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do zastosowania tabletek Ortex 600 jest uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Działania niepożądane

Rzadko mogą wystąpić dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty).

Ostrzeżenia

Jeśli lek jest podawany w zaostrzeniu dolegliwości związanych z żylakami odbytu może być konieczne stosowanie leczenia jak w innych chorobach odbytu. Leczenie powinno trwać do 15 dni.

Producent

STRAGEN PHARMA