

Otrivin 0,1%, 1 mg/ml, aerozol do nosa, 10 ml



Cena: 35,41 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Nos, Zatoki
Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OTRIVIN
Opakowanie	10 ml
Postać	Aerozol
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Alergia, Katar, Stan zapalny, Uczulenie, Zapalenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Otrivin to lek przeznaczony do stosowania w przypadku zatkanego nosa z obrzękiem i przekrwieniem błony śluzowej. Ułatwia oddychanie przez nos oraz zmniejsza ilość wydzieliny.

Wskazania

- Przekrwienie błony śluzowej nosa, które towarzyszy katarowi siennemu, przeziębieniu, alergicznemu zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok,
- Wspomagająco w zapaleniu zatok - lek ułatwia odpływ zalegającej wydzieliny,
- Wspomagająco w leczeniu ucha środkowego (lek zmniejsza przekrwienie błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej),
- Wziernikowanie nosa (rodzaj badania).

Działanie

Otrivin zawiera w swoim składzie ksylometazolinę w postaci chlorowodoru, która wpływa na naczynia krwionośne - obkurcza je, tym samym zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. W efekcie zmniejsza się również ilość wydzieliny. Ułatwia oddychanie w przypadku uczucia zatkanego nosa. Inne składniki zawarte w leku wykazują działanie nawilżające co zapobiega wysychaniu i podrażnieniom śluzówki.

Dawkowanie

Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1 dawka do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę. Nie stosować więcej niż 3 razy na dobę. Ostatnią dawkę zaleca się zaaplikować bezpośrednio przed snem.

Skład

- Substancją czynną jest: ksylometazolina (Xylometazolini hydrochloridum).
- 1 ml roztworu (aerozolu) zawiera 1 mg chlorowodoru ksylometazoliny.
- Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, sorbitol 70%, hypromeloza 4000, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Otrivin:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - chlorowodorek ksylometazoliny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent w przeszłości miał operację wykonywaną przez nos, np. usunięcie przysadki lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej),
- w przypadku jaskry z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku),
- jeśli pacjent ma znacznie wysuszoną błonę śluzową nosa (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa, zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa).

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- nudności,
- ból głowy,
- pieczenie w miejscu podania,
- suchość lub podrażnienie błony śluzowej nosa.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- reakcja uczuleniowa (alergiczna) - swędzenie, wysypka skórna,
- przemijające zaburzenia widzenia,
- przyspieszona lub niemiaraowa praca serca.


Ostrzeżenia

- Stosowanie leku omówić z lekarzem, jeśli u pacjenta występują: podwyższone ciśnienie krwi, choroby serca, nadczynność tarczycy, cukrzyca, rozrost gruczołu krokowego, łagodny nowotwór nadnerczy, nadwrażliwość na substancje podobne do ksylometazoliny lub są przyjmowane bądź w ostatnich 14 dniach były podawane inhibitory MAO (leki stosowane w depresji).
- Lek nie powinno stosować się dłużej niż 10 kolejnych dni ze względu na ryzyko nasilenia się objawów lub ich nawrót.
- Lek przeznaczony do stosowania donosowego, nie stosować do oczu, w jamie ustnej, do ucha.
- Lek zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błon śluzowych.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Producent

GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
W. Rzymowskiego 53
Warszawa

Galeria



Szybko
odblokowuje

PHOTO 12-02-2024

