

Otrivin 0,5 mg/ml Aerozol do nosa dla dzieci 10 ml



Cena: 28,07 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 ml
Postać	Aerozol
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Przeciwozbrękowe, Udrażniające nos, Ułatwiający oddychanie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Od 2 lat

Opis produktu

Opis

Kiedy uporczywy katar utrudnia zasypianie i codzienne funkcjonowanie Twojego dziecka, a także w przypadku nawracających przeziębień i alergii, specjalnie stworzono aerozol do nosa Otrivin dla dzieci.

Wskazania

Lek Otrivin krople dla dzieci stosuje się u dzieci od 2. do 11. roku życia:

- w celu ułatwienia odpływu wydzieliny ze zmienionych zapalnie zatok przynosowych,
- wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego (w celu zmniejszenia przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej),
- w celu ułatwienia wziernikowania nosa (badania jamy nosowej).

Działanie

Szybka i długotrwała ulga przy zatkanym nosie.

Dawkowanie

- Dzieci w wieku od 2 do 5 lat; 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, 1-2 razy na dobę (co 8-10 godzin), pod nadzorem dorosłych.
- Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 1-2 dawki aerozolu do każdego otworu nosowego, 2-3 razy na dobę, pod nadzorem dorosłych.

Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: ksylometazolinę chlorowodorek (Xylometazolini hydrochloridum) 0,5 mg,
- substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan

dwunastowodny, sodu chlorek, sorbitol 70%, hypromeloza 4000, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Otrivin 0,05%:

- jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodrek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent przebył operację wykonywaną przez nos, np. usunięcie przysadki lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej (operacja mózgu wykonywana przez nos lub usta);
- jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku);
- jeśli u pacjenta błona śluzowa nosa jest bardzo sucha (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa).

Działania niepożądane

- Częste działania niepożądane: suchość lub podrażnienie błony śluzowej nosa, nudności, ból głowy, pieczenie w miejscu podania.
- Bardzo rzadkie działania niepożądane: reakcja alergiczna (wysypka skórna, swędzenie), przemijające zaburzenia widzenia, niemiarowa lub przyspieszona czynność serca.

Ostrzeżenia

- Otrivin 0,05% zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błon śluzowych.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C.

Producent

NOVARTIS CONSUMER
Marynarska 15
Warszawa

Galeria

