

Otrivin Ipra MAX, 0,5 mg+0,6 mg/ml, aerozol do nosa, 10 ml



Cena: 40,57 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Nos
Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OTRIVIN
Opakowanie	10 ml
Postać	Aerozol
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Alergia, Katar, Uczulenie, Zapalenie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów, Od 18 lat

Opis produktu

Opis

Otrivin Ipra MAX to lek, który stosuje się w przypadku kataru z wodnistą wydzieliną, będącego objawem przeziębienia.

Wskazania

Leczenie objawowe wodnistego kataru i przekrwienia błony śluzowej nosa, które towarzyszą przeziębieniu.

Działanie

Otrivin Ipra Max zwęża naczynia krwionośne znajdujące się w błonie śluzowej nosa, czego efektem jest łatwiejsze i swobodniejsze oddychanie oraz mniejsze przekrwienie błony. Ipratropiowy bromek zmniejsza ilość wydzieliny z nosa - zmniejsza katar.

Dawkowanie

Dorośli: 1 dawka do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę. Pomiędzy kolejnymi aplikacjami do nosa, należy zachować 6-godzinny odstęp czasu.

Skład

- Substancjami czynnymi są: ksylometazolina (Xylometazolini hydrochloridum) i ipratropiowy bromek (Ipratropii bromidum).
- 1 ml leku zawiera 0,5 mg chlorowodoru ksylometazoliny i 0,6 mg bromku ipratropiowego.
- Substancje pomocnicze: disodu edetynian, glicerol 85%, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek i kwas solny stężony.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Otrivin Ipra MAX:

- u dzieci w wieku poniżej 18 lat,
- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na chlorowoderek ksylometazoliny lub bromek ipratropiowy, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent ma uczulenie na atropinę lub substancje podobne, np. hioscyjaminę i skopolaminę,
- jeśli pacjent miał usuwany gruczoł przysadkowy podczas operacji wykonywanej przez nos,
- jeśli pacjent miał operację mózgu przeprowadzoną przez nos lub jamę ustną,
- jeśli u pacjenta występuje jaskra (zwiększone ciśnienie w oku),
- jeśli pacjent ma bardzo suchą błonę śluzową nosa (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa).

Działania niepożądane

Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 osób):

- krwawienie z nosa,
- suchość błony śluzowej nosa.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- zaburzenia smaku,
- suchość błony śluzowej jamy ustnej,
- dyskomfort w nosie, przerwanie błony śluzowej nosa, ból nosa,
- suchość i podrażnienie gardła.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- zmienione czucie zapachu, podrażnienie oczu, suchość oczu,
- dyskomfort, zmęczenie,
- kichanie, ból gardła, kaszel, chrypka,
- zawroty głowy, drżenie,
- nudności, rozstrój żołądka.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- katar.

Częstość nieznana:

- uczucie dyskomfortu w okolicy nosa,
- uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej,
- nieregularne tętno,
- pokrzywka, wysypka,
- zaburzenia ostrości wzroku, rozszerzenie źrenic,
- trudności w opróżnianiu pęcherza.

Ostrzeżenia

- Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni ze względu na możliwy nawrót lub nasilenie się objawów związanych z zatkanym nosem.
- Podczas aplikacji leku, należy unikać kontaktu z oczami.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na lek, jego stosowanie należy przerwać, a w razie potrzeby, skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy stosować leku u osób poniżej 18 lat.
- Lek należy przechowywać w miejscu i w sposób niedostępny dla dzieci oraz w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Producent

NOVARTIS CONSUMER
Marynarska 15
Warszawa

Galeria

