

Otrivin Menthol, 1 mg/ml, aerozol do nosa, 10 ml



Cena: 43,35 zł

Opis słownikowy

Część ciała	Nos, Zatoki
Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	OTRIVIN
Opakowanie	1 but. po 10 ml
Postać	Aerozol
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Katar, Zatoki
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Otrivin Menthol to konserwantów pozbawiony lek w sprayu do nosa, zawierający ksylometazoliny chlorowodorek jako substancję czynną. Stosuje się go do udrażnienia nosa i ułatwienia oddychania w przypadku kataru, przekrwienia i obrzęku błony śluzowej nosa. Objawy te pojawiają się przy przeziębieniu, katarze siennym, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa oraz zapaleniu zatok. Dodatkowo Otrivin Menthol zawiera eukaliptol i inne substancje, które wywołują uczucie chłodu na błonach śluzowych. Działanie leku rozpoczyna się w ciągu 2 minut i utrzymuje się do 12 godzin. Otrivin Menthol można stosować u dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia.

Wskazania

Otrivin Menthol stosuje się: w nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej nosa występującym w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok; wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego, ponieważ lek zmniejsza przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej, jako środek ułatwiający wżernikowanie nosa (badanie jamy nosowej).

Działanie

- Otrivin Menthol jest miejscowo działającym lekiem zmniejszającym przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. Odblokowuje zatkany nos, ułatwiając oddychanie. Dodatkowo lek zmniejsza przekrwienie błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej.
- Lek zawiera substancje pomocnicze, takie jak mentol i eukaliptol, które dają na błonach śluzowych uczucie chłodu.
- Działanie leku Otrivin Menthol rozpoczyna się w ciągu 2 minut i trwa do dwunastu godzin.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 dawka aerozolu Otrivin Menthol do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę. Ostatnią dawkę leku należy przyjąć bezpośrednio przed snem.
- Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę do każdego otworu nosowego.

Skład

- Substancją czynną leku jest ksylometazoliny chlorowodorek (Xylometazolini hydrochloridum).
- 1 ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku.
- Substancje pomocnicze: sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, disodu edetynian, lewomentol, cyneol (eukaliptol), sorbitol, makrogoliglicerolu hydroksystearynian, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku oraz u dzieci w wieku poniżej 12 lat, w czasie ciąży, jeśli pacjent przebył operację wykonywaną przez nos, jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania, jeśli błona śluzowa nosa jest sucha.

Działania niepożądane

- Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 do 10 osób stosujących lek): suchość lub podrażnienie błony śluzowej nosa, uczucie dyskomfortu w nosie, nudności, ból głowy, pieczenie w miejscu podania.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek): reakcja alergiczna (wysypka skórna, swędzenie), zaburzenia widzenia, niemiaraowa lub przyspieszona czynność serca.

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku omówić z lekarzem, jeśli u pacjenta występują: podwyższone ciśnienie krwi, choroby serca, nadczynność tarczycy, cukrzyca, rozrost gruczołu krokowego, łagodny nowotwór nadnerczy,
- Należy skonsultować się z lekarzem jeśli pacjent przyjmuje lub w ostatnich 14 dni były podawane inhibitory MAO (leki stosowane w depresji).
- U osób wrażliwych lek może powodować bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze.
- Stosowanie leku przez okres dłuższy niż 10 dni lub w dawkach większych niż zalecane, może spowodować nasilenie objawów lub ich nawrót.
- Nie stosować Otrivin Menthol do oczu lub w jamie ustnej.
- W okresie karmienia piersią lek można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
- Nie należy stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C.

Producent

Haleon Poland Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa
mystory.pl@haleon.com

Galeria

