

# Oxalin Baby 0,025% żel do nosa 0,25 mg/g butelka 10 g z dozownikiem



Cena: 22,64 zł

## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 g (but.)
Postać	żel do nosa
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Przeznaczenie	Przeciwobrzękowe, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Od 1 roku życia

## Opis produktu

### Opis

**Preparat Oxalin 0,025%** zawiera substancję czynną, jaką jest chlorowodorek oksymetazoliny. Stosowany miejscowo na błonę śluzową nosa, powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa oraz hamowanie nadmiernego wydzielania wydzieliny. Przyczynia się do poprawy drożności przewodów nosowych, ułatwiając odpływ wydzieliny z zatok przynosowych. Oxalin Baby to specjalne krople na katar przeznaczone dla dzieci w wieku od 1 do 6 lat.

### Wskazania

W ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa, alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, zapaleniu zatok przynosowych. Oxalin Baby żel do nosa przeznaczony jest dla dzieci po ukończeniu 1. roku życia.

### Działanie

Zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa i zahamowanie nadmiernego wydzielania. Poprawia drożność przewodów nosowych, ułatwia odpływ wydzieliny z zatok przynosowych

### Dawkowanie

Dzieci w wieku powyżej 1. roku życia do 6 lat: 1 dawka do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę.

### Skład

1g żelu zawiera 0,25mg oksymetazoliny chlorowodoru oraz substancje pomocnicze: sodu chlorek, disodu fosforan dwunasto wodny, sodu diwodoru fosforan jednowodny, disodu edetynian, hydroksyetylocelulozę, glicerol, benzalkoniowy chlorek roztwór, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oxalin 0,025%:



- jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik leku;
- jeśli pacjent ma suche zapalenie błony śluzowej nosa (zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów).

#### Działania niepożądane

- Często: pieczenie w miejscu podania, suchość błony śluzowej nosa, kichanie.
- Niezbyt często: kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca; zwiększenie ciśnienia tętniczego.
- Rzadko: niepokój ruchowy, bezsenność, bóle głowy; zmęczenie; silne uczucie „zatkania nosa” w wyniku nasilenia obrzęku błony śluzowej nosa (występuje po ustaniu działania leku, jako objaw przekrwienia reaktywnego).

#### Ostrzeżenia

- Lek zawiera w składzie chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie błony śluzowej nosa.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Okres ważności leku po pierwszym otwarciu butelki wynosi 12 tygodni.

#### Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

#### Producent

POLFA WARSZAWA  
Karolkowa 22/24  
Warszawa