

Oxyrin Apteo Med Aerozol do nosa, 15 ml



Cena: 22,34 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	APTEO
Opakowanie	1 but. po 15 ml
Postać	Aerozol
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Katar
Rodzaj produktu	Lek
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Oxyrin Apteo Med to aerozol działający miejscowo, który zwęża naczynia krwionośne i udrażnia nos. Jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia.

Wskazania

Lek wskazany jest w miejscowym i tymczasowym łagodzeniu obrzęku błony śluzowej nosa wywołanego zapaleniem błony śluzowej nosa

Składniki

- Substancją czynną leku jest Oksymetazolinę chlorowodorek 0,5 mg/ml.
- Pozostałe składniki: Benzalkoniowy chlorek, Disodu fosforan bezwodny, Sodu diwodorofosforan dwuwodny, Glicyna, Sorbitol ciekły, Niekryształujący, Woda oczyszczona.

Stosowanie

Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia:

- Zalecana dawka to jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, maksymalnie dwa razy na dobę.
- Leku nie należy stosować dłużej niż przez 7 dni bez konsultacji z lekarzem.
- Jedna dawka leku do nosa przed snem powinna zapewnić drożność nosa na całą noc.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować Oxyrin Apteo Med:

- jeśli pacjent ma uczulenie na oksymetazolinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli pacjent stosuje lub stosować w ciągu ostatnich 14 dni leki przeciwdepresyjne (stosowane w leczeniu depresji);

- jeśli pacjent stosuje inne sympatykomimetyczne leki obkurczające błonę śluzową;
- jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie płynu wewnątrz oka (jaskra z wąskim kątem przesączania);
- jeśli pacjent miał niedawno operację neurochirurgiczną (przezskłnowe usunięcie przysadki mózgowej lub inny zabieg chirurgiczny z odsłonięciem opony twardej);
- jeśli u pacjenta występuje choroba serca lub choroba układu krążenia;
- jeśli pacjent ma suche zapalenie błony śluzowej nosa z tworzenia strupów (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa).

Działania niepożądane

- Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów): pieczenie, suchość i (lub) podrażnienie błony śluzowej nosa lub kichania. Nadmierne lub dalsze stosowanie leku może spowodować przekrwienie błony śluzowej nosa ze względu na efekt z odbicia.
- Rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): niepokój, zmęczenie, drażliwość, zaburzenia snu u dzieci, szybkie bicie serca, wzrost ciśnienia krwi, uczucie zatkanego nosa, obrzęk błony śluzowej nosa, ból głowy, nudności, zaczerwienienie, wysypka i zaburzenia widzenia.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Oxyrin Apteo Med, należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- jeśli pacjent ma duże stężenie cukru we krwi (cukrzyca);
- jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie tętnicze);
- jeśli u pacjenta występuje choroba gruczołu krokowego (powiększona prostata);
- jeśli u pacjenta występuje choroba tarczycy (nadczynność tarczycy);
- jeśli pacjent ma guza nadnerczy (guz chromochłonny);
- jeśli pacjent przyjmuje adrenergiczne leki rozszerzające oskrzela (leczenie astmy), fenotiazyny (leki uspokajające) lub metylodope (w celu obniżenia ciśnienia krwi);
- jeśli u pacjenta występuje bezsenność (bardzo rzadko występujące przypadki), należy unikać stosowania leku późnym wieczorem lub w nocy.

Producent

SYNOPTIS PHARMA