


Pangrol 10 000, 50 kapsułki



Cena: 42,46 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	BERLIN CHEMIE AG
Przeznaczenie	Trawienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Lek Pangrol 10 000 zawiera enzymy trawienne pochodzące z pobrania. Te enzymy są niezbędne do trawienia i wchłaniania pokarmu w pokarmie.

Wskazania

Uzupełnianie enzymów trzustkowych w zaburzeniach trawienia wynikających z braku lub niedostatecznego wydzielania i (lub) działania enzymów trzustkowych w dwunastnicy.

Działanie

Uzupełnienie enzymów trzustkowych u osób z zaburzeniami trawienia wynikającymi z braku lub niedostatecznego wydzielania i (lub) działania enzymów trzustkowych w dwunastnicy.

Dawkowanie

Zalecana dawka lipazy u dorosłych wynosi 20 000-40 000 j. Ph. Eur. na jeden posiłek, o ile lekarz nie zaleci innego dawkowania, należy przyjmować od 2 do 4 kapsułek na każdy posiłek (co odpowiada od 20 000 do 40 000 j. Ph. Eur. na jeden posiłek). Dawkowanie u dzieci ustala lekarz.

Skład

1 kapsułka zawiera substancje czynną pankreatynę o aktywności enzymatycznej: lipazy 10000 j.Ph.Eur., amylazy 9000 j.Ph.Eur., proteazy 500 j.Ph.Eur. oraz substancje pomocnicze: kroskarmeloza sodowa; celuloza mikrokrystaliczna; olej rycynowy, utwardzany; krzemionka koloidalna bezwodna; magnezu sterynian; 30% wodna zawiesina kopolimeru etyloakrylanu z kwasem metakrylowym (1:1), typ C; trietylu cytrynian; symetykonu emulsja 30%; talk; kapsułka: żelatyna; żelaza tlenek czerwony (E 172); żółcień chinolinowa (E 104); żelaza tlenek żółty (E 172); indygotyna (E 132); tytanu dwutlenek (E 171).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pangrol 10 000:

- u pacjentów z nadwrażliwością na wieprzowinę lub inny składnik leku Pangrol 10 000,
- u pacjentów z ostrym zapaleniem trzustki i ostrymi napadami w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, w fazie zaostrzenia choroby.

Ostrzeżenia

- Lek Pangrol 10 000 zawiera czynne enzymy, które w przypadku uwolnienia w jamie ustnej, na przykład po rozgryzieniu kapsułki, mogą prowadzić do uszkodzenia (owrzodzeń) błony śluzowej jamy ustnej. Dlatego należy zachować ostrożność i przyjmować lek wyłącznie w sposób zgodny z opisaniem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.