

Pangrol 10 000, kapsułki, 20 kapsułek

Cena: 30,83 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PANGROL
Opakowanie	20 kapsułek
Postać	Kapsułki
Producent	BERLIN-CHEMIE AG
Przeznaczenie	Ułatwiające trawienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Pangrol to bez recepty lek zawierający enzymy trzustkowe. Jest stosowany w przypadkach niedoboru lub nieprawidłowego działania własnych enzymów trawiennych.

Wskazania

Pangrol 10 000 służy do uzupełnienia enzymów trawiennych w przypadku ich niedoboru lub ich niewystarczającego działania. Stan taki może występować w przypadku:

- przewlekłego zapalenia trzustki niezależnie od przyczyny (na tle alkoholowym, urazowym, autoimmunologicznym, polekowym, zwapnienia tropikalnego, samoistnego);
- swoistej nieprawidłowej czynności trzustki (mukowiscydoza);
- zwężenia przewodu trzustkowego spowodowanego np. przez chorobę nowotworową lub kamienie żółciowe;
- zaburzenia wątroby i dróg żółciowych;
- przebytej operacji trzustki lub wycięcia trzustki i dwunastnicy;
- przyspieszonego pasażu jelitowego po przebytej operacji żołądka i jelit, na skutek stresu lub chorób zapalnych jelit;
- spożywania ciężkostrawnych pokarmów roślinnych, tłuszczów lub pokarmów, do których układ trawienny nie jest przyzwyczajony, prowadzącego do

pogorszenia wchłaniania substancji odżywczych i zaburzeń trawienia z towarzyszącą utratą apetytu, odbijaniem się, odruchami wymiotnymi i biegunką (niestrawność);

- choroby trzewnej;
- choroby zapalnej jelit (zwłaszcza choroby Crohna);
- cukrzycy;
- zespołu nabytego braku odporności (AIDS);
- zespołu Shwachmana;

- zespołu Sjögrena.

Działanie

Głównym składnikiem leku Pangrol jest pankreatyna, czyli sproszkowana trzustka ssaków (w tym przypadku wieprzowa). Zawiera ona enzymy trawienne. Lipaza odpowiada za trawienie tłuszczu, proteazy – białek, amylazy – cukrów.

Dawkowanie

U dorosłych zwykle stosuje się 2-4 kapsułki na każdy posiłek. Dawka zależy od nasilenia zaburzeń trawienia. W jej ustaleniu pomocna jest wizyta u lekarza.

Skład

Substancją czynną jest pankreatyna wieprzowa o aktywności enzymatycznej:

- lipazy 10 000 j.
- amylazy 9 000 j.
- proteaz 500 j.

Substancje pomocnicze: minitabletki: kroscarmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, olej rycynowy, utwardzany, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, 30% wodna zawiesina kopolimeru etyloakrylanu z kwasem metakrylowym (1:1), typ c, trietylu cytrynian, symetykonu emulsja 30%, talk; kapsułka: żelatyna, żelaza tlenek czerwony (e 172), żółcień chinolinowa (e 104), żelaza tlenek żółty (e 172), indygotyna (e 132), tytanu dwutlenek (e 171)

Przeciwwskazania

Leku Pangrol nie powinno się stosować w przypadku nadwrażliwości na pankreatynę, mięso wieprzowe lub inne składniki leku. Przeciwwskazaniem będzie również ostre zapalenie trzustki i ostre napady w przebiegu przewlekłego zapalenia trzustki, w okresie zaostrzenia choroby.

Działania niepożądane

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób)

- Biegunka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, ból brzucha, nudności, wymioty.
- Reakcje alergiczne typu natychmiastowego, takie jak: wysypka skórna, pokrzywka, kichanie, łzawienie oczu, duszność spowodowana zwężeniem dróg oddechowych (skurcz oskrzeli), duszność.
- Reakcje alergiczne ze strony przewodu pokarmowego.
- W przypadku pacjentów z mukowiscydozą, po przyjęciu dużych dawek leku, opisywano występowanie zwężeń dolnych fragmentów jelita (w obszarze krętniczo-kątniczym i okrężnicy wstępującej), które mogą prowadzić do niedrożności jelit.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- U pacjentów z mukowiscydozą, głównie w przypadku dużych dawek leku, może dojść do zwiększonego wydalania kwasu moczowego z moczem. Z tego powodu stężenie kwasu moczowego w moczu u tych pacjentów powinno być monitorowane, aby zapobiec powstawaniu kamieni z kwasu moczowego.

Ostrzeżenia

- Lek Pangrol 10 000 zawiera czynne enzymy, które w przypadku uwolnienia w jamie ustnej, na przykład w wyniku rozgryzienia kapsułki, mogą prowadzić do podrażnienia (owrzodzeń) błony śluzowej jamy ustnej.
- Wszelkie nietypowe objawy ze strony brzucha, żołądka, jelit powinny być zbadane przez lekarza. Dotyczy to szczególnie osób przyjmujących ponad 10000 j. Ph. Eur. lipazy na kg masy ciała na dobę.
- W przypadku objawów wskazujących na niedrożność jelit (np. ból brzucha, brak czynności jelit, nudności, wymioty) należy skontaktować się z lekarzem. Problem ten głównie dotyczy pacjentów z mukowiscydozą.

Producent

BERLIN CHEMIE AG
Cybernetyki 7 B
Warszawa