


# Pantoprazol Teva 20 mg, 14 tabletek

Cena: 7,93 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	TEVA
Opakowanie	14 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	INPHARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nadkwaśność, Refluks, Wrzody, Zgaga
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

Pantoprazol **Teva** jest wskazany do krótkotrwałego leczenia objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych.

### Wskazania

Pantoprazol Teva jest wskazany do krótkotrwałego leczenia objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych).

### Działanie

Zmniejszanie ilości kwasu w żołądku poprzez blokowanie "pompy" wytwarzającej kwas żołądkowy.

### Dawkowanie

Zalecana dawka leku to 20 mg pantoprazolu (1 tabletką) raz na dobę. W celu uzyskania złagodzenia objawów, konieczne może okazać się stosowanie produktu przez kolejne 2-3 dni.

### Skład

1 tabletką zawiera:

- substancję czynną: pantoprazol 20 mg w postaci sodu półtorawodnego),
- substancje pomocnicze: disodu fosforan, mannitol, celuloza mikrokryształiczna, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza (typ 6cP), trietylu cytrynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%, żelaza tlenek żółty (E 172).

### Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pantoprazol Teva:

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancję czynną - pantoprazol lub pozostały składnik tego leku,
- jeśli pacjent przyjmuje inhibitory proteazy wirusa HIV,
- jeśli są planowane specyficzne badania krwi (stężenie chromograniny A).

#### Działania niepożądane

- łagodne polipy dna żołądka.
- zawroty i bóle głowy,
- wymioty, nudności, biegunka, zaparcia,
- wzdęcia,
- ból i dyskomfort w obrębie brzucha,

#### Ostrzeżenia

- Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli: pacjent jest już leczony z powodu zgagi, w wywiadzie pojawia się choroba wrzodowa żołądka lub operacja żołądka, występują zaburzenia pracy wątroby, występowała kiedykolwiek reakcja skórna po podaniu pantoprazolu lub innego leku z grupy inhibitorów pompy protonowej, pacjent przyjmuje leki z grupy inhibitorów proteazy wirusa HIV.
- Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 4 tygodnia oraz 2 tygodnie w przypadku jeśli objawy nie ustępują.
- Długotrwałe stosowanie leku może wiązać się z ograniczonym wchłanianiem witaminy B12, obniżeniem stężenia magnezu we krwi.
- Jeśli podczas stosowania tego leku wystąpią: nieplanowana utrata masy ciała, wymioty z krwią lub wymioty nawracające, krew w kale, smoliste stolce, błądź i osłabienie, ból w klatce piersiowej, ból brzucha, ciężkie biegunki, należy skontaktować się z lekarzem w celu dalszej diagnostyki.
- Lek nie jest przeznaczony do natychmiastowego łagodzenia objawów zgagi. Nie należy stosować go zapobiegawczo.
- Pantoprazol Teva w razie konieczności może być stosowany razem z lekami zobojętniającymi (wodorowęglan sodu, wodorotlenek glinu, węglan magnezu).
- Przechowywać lek w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

#### Producent

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.  
ul. Emilii Plater 53  
00-113 Warszawa