


Pantoprazol Teva, 20 mg, tabletki dojelitowe, 14 sztuk

Cena: 11,02 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	TEVA
Opakowanie	14 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
Przeznaczenie	Refluks, Układ pokarmowy, Zgaga
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Pantoprazol Teva to lek stosowany krótkotrwale w celu łagodzenia objawów refluksu żołądkowo-przełykowego, takich jak zgaga i kwaśne odbijanie, które pozostawiają kwaśny posmak w ustach. Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Wskazania

Leczenie objawowe:

- choroby refluksowej przełyku,
- zgagi,
- kwaśnego odbijania.

Działanie

Pantoprazol Teva należy do tzw. inhibitorów pompy protonowej, czyli grupy leków, która blokuje wytwarzanie kwasu żołądkowego, czego efektem jest zmniejszenie jego ilości w żołądku. Pantoprazol blokuje pompę protonową w komórkach okładzinowych żołądka. Lek ten może usunąć lub złagodzić dolegliwości związane z chorobą refluksową przełyku.

Dawkowanie

Dorośli: 1 tabletka dojelitowa na dobę, o stałej porze.

Skład

- Substancją czynną jest: pantoprazol (Pantoprazolum).
- 1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu w postaci sodu półtorawdonego.
- Substancje pomocnicze: disodu fosforan, mannitol, celuloza mikrokryształiczna, kroscarmeloza sodowa, magnezu stearynian, hypromeloza (typ 6cP), trietylu cytrynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), kwasu metakrylowego i etylu akrylanu

kopolimer (1:1) dyspersja 30%, żelaza tlenek żółty (E 172).

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pantoprazol Teva:

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancję czynną - pantoprazol lub pozostały składnik tego leku,
- jeśli pacjent przyjmuje inhibitory proteazy wirusa HIV,
- jeśli są planowane specyficzne badania krwi (stężenie chromograniny A).

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- łagodne polipy dna żołądka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- zawroty i bóle głowy,
- wymioty, nudności, biegunka, zaparcia,
- wzdęcia,
- ból i dyskomfort w obrębie brzucha,
- wysypka, świąd, pokrzywka.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- zaburzenia wzroku - niewyraźne widzenie,
- bóle stawów, mięśni,
- zmiana masy ciała,
- obrzęk kończyn - nóg i rąk.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- dezorientacja,
- zmniejszenie liczby płytek krwi co może wiązać się z pojawieniem się wybroczyn na skórze,
- zmniejszenie liczby białych krwinek co może wiązać się ze zwiększoną częstością zakażeń.

Częstość nieznana:

- omamy, splątanie,
- zmniejszenie stężenia sodu, magnezu, wapnia we krwi,
- wysypka przebiegająca z bólem stawów,
- uczucie mrowienia, pieczenia, drętwienia, kłucia.

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli: pacjent jest już leczony z powodu zgagi, w wywiadzie pojawia się choroba wrzodowa żołądka lub operacja żołądka, występują zaburzenia pracy wątroby, występowała kiedykolwiek reakcja skórna po podaniu pantoprazolu lub innego leku z grupy inhibitorów pompy protonowej, pacjent przyjmuje leki z grupy inhibitorów proteazy wirusa HIV.
- Lek nie powinien być stosowany dłużej niż 4 tygodnia oraz 2 tygodnie w przypadku jeśli objawy nie ustępują.
- Długotrwałe stosowanie leku może wiązać się z ograniczonym wchłanianiem witaminy B12, obniżeniem stężenia magnezu we krwi.
- Jeśli podczas stosowania tego leku wystąpią: nieplanowana utrata masy ciała, wymioty z krwią lub wymioty nawracające, krem w kale, smoliste stolce, bladość i osłabienie, ból w klatce piersiowej, ból brzucha, ciężkie biegunki, należy skontaktować się z lekarzem w celu dalszej diagnostyki.
- Lek nie jest przeznaczony do natychmiastowego łagodzenia objawów zgagi. Nie należy stosować go zapobiegawczo.
- Pantoprazol Teva w razie konieczności może być stosowany razem z lekami zobojętniającymi (wodorowęglan sodu, wodorotlenek glinu, węglan magnezu).
- Przechowywać lek w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Producent

TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA
Emilii Plater 53
Warszawa

Galeria

