

Panzol Pro, 20 mg, tabletki dojelitowe, 14 tabletek

Cena: 5,93 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PANZOL PRO
Opakowanie	14 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	APOTEX EUROPE B.V.
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Panzol Pro to lek stosowany w chorobie refluksowej żołądka (zgaga) w celu ograniczenia produkcji kwasu żołądkowego.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku z objawami jak zgaga, zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej u dorosłych.

Działanie

Panzol Pro zawiera pantoprazol, który hamuje wydzielanie kwasu solnego w żołądku przez komórki okładzinowe (lek hamuje końcowy etap wytwarzania kwasu solnego), tym samym zmniejsza ilość wytwarzanego soku żołądkowego.

Dawkowanie

Dorośli: 1 tabletkę na dobę. Przyjmowanie leku należy kontynuować przez 2-3 kolejne dni. Stosowanie leku przerwać w momencie ustąpienia objawów.

Skład

- Substancją czynną jest: pantoprazol (Pantoprazolum).
- 1 tabletkę dojelitową zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).
- Substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: maltitol (E965), krospowidon typ B, karmeloza sodowa, sodu węglan bezwodny, wapnia stearynian; otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, lecytyna sojowa, żelaza tlenek żółty (E172), sodu węglan bezwodny, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), laurylosiarczan sodu, polisorbat 80, trietylu cytrynian.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Panzol Pro:

- w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na pantoprazol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

- jeśli pacjent przyjmuje atazanawir,
- u osób poniżej 18 lat,
- w okresie ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- polipy żołądka (łagodne).

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

- ból głowy, zawroty głowy,
- biegunka, nudności, wzdęcia, zaparcia,
- suchość w jamie ustnej,
- ból i dyskomfort w obrębie brzucha,
- wysypka skórna, swędzenie skóry,
- osłabienie, złe samopoczucie, zaburzenia snu,
- zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- zaburzenia odczuwania smaku, zaburzenia wzroku (niewyraźne widzenie),
- bóle stawów, bóle mięśni,
- obrzęk kończyn,
- zwiększone stężenie bilirubiny i lipidów we krwi,
- ginekomastia u mężczyzn.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- zaburzenia orientacji,
- zwiększona tendencja do siniaków,
- zmniejszenie liczby białych krwinek (tendencja do infekcji).

Częstość nieznana:

- omamy, splątanie,
- uczucie kłucia lub palenia,
- skurcze mięśni,
- wysypka z bólem stawów.

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli: zgaga trwa powyżej 4 tygodni, pacjent przebył chorobę wrzodową, u pacjenta występuje żółtaczką, kiedykolwiek wystąpiła wysypka po podaniu podobnego leku.
- Jeśli podczas stosowania leku lub tuż po wystąpią następujące objawy: znaczna utrata wagi (bez powiązania z dietą i ćwiczeniami), wymioty w tym krwawe wymioty, problemy z połykaniem z towarzyszącym bólem, ból w klatce piersiowej, ból brzucha, należy skonsultować się z lekarzem.
- Objawy zgagi mogą zmniejszyć się po zastosowaniu już 1 dawki leku. Nie jest to lek do stosowania zapobiegawczego i natychmiastowego usuwania objawów związanych ze zgagą.
- Panzol Pro zawiera lecytynę sojową. Nie należy stosować tego leku w przypadku nadwrażliwości na orzeszki ziemne lub soję.

Producent

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
Sokratesa 13 D/27
01-909 Warszawa

Galeria

