

Paracetamol Biofarm, 1000 mg, tabletki powlekane, 10 tabletek

Cena: 11,37 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Paracetamol Biofarm to preparat wykazujący działanie przeciwbólowe i obniżające gorączkę, zawierający podwyższoną dawkę substancji czynnej – 1000 mg.

Wskazania

Paracetamol Biofarm stosuje się podczas bóli różnego pochodzenia i o różnym natężeniu, szczególnie: bóle głowy, migreny, bóle reumatyczne, bóle stawowe, mięśniowe i kostne, bóle kręgosłupa, nerwobóle, bóle menstruacyjne, bóle zębów.

Działanie

Lek Paracetamol Biofarm zawiera substancję czynną paracetamol o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Lek nie działa przeciwwrzepalnie. Paracetamol działa słabiej drażniąco na żołądek niż niesteroidowe leki przeciwwrzepalne (np. kwas acetylosalicylowy).

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież od 12 lat o masie ciała minimum 50 kg: jednorazowo stosuje się 1 tabletkę, jeśli jest taka konieczność kolejną można przyjąć w odstępie 4 do 6 godzin.
- Maksymalna dawka dobową wynosi 4 tabletki (4 000mg paracetamolu).

Skład

- Substancją czynną leku jest paracetamol (Paracetamolum).
- Jedna tabletkę powlekana zawiera 1000 mg paracetamolu (Paracetamolum).
- Substancje pomocnicze: skrobia żelowana (kukurydziana), krospowidon, powidon, kwas stearynowy, kroscarmeloza sodowa, magnezu stearynian; otoczka tabletki (AquaPolish clear 09.03VF): hypromeloza 6cP, talk, glicerol.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Paracetamol Biofarm, jeśli pacjent: ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby, nerek; ma chorobę alkoholową; stosuje (także w ciągu 14 dni od odstawienia) inhibitory monoaminooksydazy (inhibitory MAO).

Działania niepożądane

- Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 osób): zaburzenia płytek krwi (zaburzenia krzepnięcia, mogące spowodować krwawienia), zaburzenia związane z komórkami macierzystymi (zaburzenia powstawania komórek krwi w szpiku kostnym); reakcje alergiczne; depresja, splątanie, omamy; drżenie, ból głowy; nieprawidłowe widzenie; obrzęk; niedociśnienie (spadek ciśnienia krwi); skurcz oskrzeli; krwawienie z przewodu pokarmowego, ból brzucha lub żołądka, biegunka, nudności, wymioty; nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczką (z objawami takimi jak zażółcenie skóry i oczu), martwica wątroby; swędzenie, wysypka, potliwość, pokrzywka, czerwone plamy na skórze, obrzęk naczynioruchowy z objawami takimi jak: obrzęk twarzy, ust, gardła lub języka; zawroty głowy, ogólne złe samopoczucie, gorączka, nadmierne uspokojenie; zatrucie.
- Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): zaburzenia krwi (zmniejszenie liczby płytek krwi, białych i czerwonych krwinek), niedokrwistość hemolityczna (rozpad czerwonych krwinek); zmniejszone stężenie glukozy (cukru) we krwi; toksyczne działanie na wątrobę (uszkodzenie wątroby); mętny, ropny mocz i zaburzenia czynności nerek; ciężkie reakcje alergiczne wymagające przerwania leczenia.
- Działania niepożądane o nieznanej częstotliwości: martwica toksyczno-rozplywna naskórka, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba skóry zagrażająca życiu); obrzęk krtani; wstrząs anafilaktyczny (ciężka reakcja alergiczna); niedokrwistość; zaburzenia czynności wątroby i zapalenie wątroby; zaburzenie czynności nerek (ciężka niewydolność nerek, krew w moczu, niemożność oddania moczu).

Ostrzeżenia

- Lek zawiera paracetamol, dlatego nie stosować produktu jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol ze względu na ryzyko przedawkowania i ciężkich działań niepożądanych. Należy unikać częstego stosowania leków zawierających paracetamol.
- Przed zastosowaniem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli: pacjent jest odwodniony; u pacjenta występuje niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (enzymu odpowiedzialnego za prawidłową czynność czerwonych krwinek); pacjent ma niedokrwistość hemolityczną (rozpad krwinek czerwonych); pacjent stosuje różne leki przeciwbólowe przez dłuższy okres czasu, ponieważ może to prowadzić do wystąpienia lub nasilenia się bólów głowy. W takiej sytuacji pacjent powinien skontaktować się z lekarzem w celu uzyskania porady; pacjent jest uczulony na kwas acetylosalicylowy, gdyż wtedy jest większe ryzyko uczulenia również na paracetamol. Szczególną ostrożność powinni zachować pacjenci z astmą oskrzelową.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

BIOFARM
Wałbrzyska 13
60-198 Poznań