

Paracetamol Biofarm, 500 mg, tabletki, 50 tabletek

Cena: 15,73 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PARACETAMOL
Opakowanie	50 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	BIOFARM SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Tabletki Paracetamol Biofarm to lek przeciwbólowy i przeciwwgorączkowy. Stosuje się go w różnych rodzajach bólu, takich jak migrena, nerwobóle, bóle menstruacyjne, zębów oraz bóle związane z gripą lub przeziębieniem. Produkt zawiera paracetamol i jest łagodny dla żołądka.

Wskazania

- Paracetamol Biofarm stosuje się podczas bóli różnego pochodzenia i o różnym natężeniu, szczególnie: bóle głowy, migreny, bóle reumatyczne, bóle stawowe, mięśniowe i kostne, bóle kręgosłupa, nerwobóle, bóle menstruacyjne, bóle zębów.
- Lek stosuje się także w celu zmniejszenia gorączki, towarzyszącej np. przeziębieniu lub grypie.

Działanie

Lek Paracetamol Biofarm zawiera substancję czynną paracetamol o działaniu przeciwbólowym i przeciwwgorączkowym. Lek nie działa przeciwzapalnie. Paracetamol działa mniej drażniaco na żołądek niż niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy).

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież od 12 lat: jednorazowo stosuje się 1 lub 2 tabletki (od 500 mg do 1000mg paracetamolu), w razie konieczności po co najmniej 4 godzinach można przyjąć ponownie 1 albo 2 tabletki od 2 do 4 razy na dobę.

Maksymalna dawka dobową wynosi 8 tabletek (4 000 mg paracetamolu).

- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: od 1/2 do 1 tabletki z zachowaniem większych odstępów czasowych.

Skład

- Substancją czynną leku jest paracetamol (Paracetamolum).
- Jedna tabletka zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).
- Substancje pomocnicze: skrobia żelowana kukurydziana, powidon K30, krospowidon A, kroskarmeloza sodowa, celuloza mikrokryształiczna, kwas stearynowy 50, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Paracetamol Biofarm, jeśli pacjent: jest uczulony na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku; ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby, nerek; ma chorobę alkoholową.

Działania niepożądane

- Należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy takie jak: Obrzęk naczynioruchowy czasem połączony z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy, trudności w oddychaniu, nadmierne pocenie się, nudności, spadek ciśnienia krwi, wstrząs, wstrząs anafilaktyczny (występują bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów); Reakcje uczuleniowe, takie jak: wysypka skórna, swędzenie, skóry pokrzywka (występują rzadko: u 1 do 10 na 10 000 pacjentów); Wysypki skórne lub ciężka reakcja skórna objawiająca się ostrą uogólnioną wysypką kropkową lub pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączką i bólami stawowymi albo pękającymi olbrzymimi pęcherzami podnaskórkowymi, rozległymi nadżerkami na skórze, złuszczeniem się dużych płatów naskórka i gorączką (występują bardzo rzadko); Problemy z oddychaniem, w razie gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (występują bardzo rzadko); Sińce lub krwawienia spowodowane trombocytopenią, zaburzeniami płytek krwi, plamica małopłytkową lub niedokrwistością hemolityczną (występują rzadko); Skłonność do zakażeń i ogólne osłabienie spowodowane przez agranulocytozę, (występują rzadko) lub pancytopenię (zmniejszenie liczby komórek krwi) (występują bardzo rzadko); Zaburzenia czynności wątroby, uszkodzenie wątroby, żółtaczką (zażółcenie skóry i białek oczu), martwica wątroby (śmierć komórek wątrobowych) (występują rzadko), hepatotoksyczność (uszkodzenie wątroby wywołane związkami chemicznymi) (występują bardzo rzadko); Przedawkowanie i zatrucie (występują rzadko); Niski poziom cukru we krwi (występują bardzo rzadko); Ropomocz, ciężkie uszkodzenie nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, krew w moczu, niemożność oddania moczu (występują bardzo rzadko).
- Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): Zaburzenia krwi w tym leukopenia i zaburzenia czynności szpiku kostnego; Depresja, dezorientacja, halucynacje; Drżenie, ból głowy; Zaburzenia widzenia; Obrzęk; Ból brzucha, krwawienia z żołądka lub jelit, biegunka, nudności, wymioty; Zawroty głowy, złe samopoczucie, gorączka, senność, interakcje z innymi lekami; Pocenie się; Plamica.
- Działania niepożądane o nieznanej częstości (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): choroby skóry wywołane przez paracetamol.

Ostrzeżenia

- Lek zawiera paracetamol, więc nie należy go stosować jednocześnie z innymi produktami leczniczymi zawierającymi tę substancję ze względu na ryzyko przedawkowania i ciężkich działań niepożądanych. Należy unikać częstego stosowania leków zawierających paracetamol.
- Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej paracetamolu, ponieważ może to spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby.
- Przed rozpoczęciem stosowania leku Paracetamol Biofarm należy omówić to z lekarzem: jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek (łagodne do umiarkowanych); jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby (łagodne do umiarkowanych); u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (enzymu odpowiedzialnego za prawidłową czynność czerwonych krwinek); jeśli pacjent ma uczulenie na kwas acetylosalicylowy, gdyż wtedy jest większe ryzyko uczulenia również na paracetamol.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze powyżej 25°C.

Producent

BIOFARM
Wałbrzyska 13
Poznań