

Paracetamol Farmina, 500 mg, czopki, 10 sztuk

Cena: 9,07 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 czopków
Postać	Czopki
Producent	FARMINA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Paracetamol Farmina 500 mg to lek stosowany w bólach i gorączce różnego pochodzenia oraz do objawowego leczenia stanów grypopodobnych i przeziębienia.

Wskazania

Lek Paracetamol Farmina stosuje się w: bólach różnego pochodzenia (ból głowy, ból zębów, bóle mięśniowe, stawowe i kostne, bolesne miesiączkowanie, ból po zabiegu chirurgicznym lub stomatologicznym); leczeniu objawowym przeziębienia i grypy; celu obniżenia gorączki przy różnych infekcjach oraz po szczepieniach.

Działanie

Paracetamol Farmina działają przeciwbólowo oraz przeciwgorączkowo.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 50 kg: 1 do 2 czopków co 4 do 6 godzin.
- Od 33,3 kg do 50 kg (od około 10 do 13 lat): 1 czopek 3 do 4 razy na dobę.

Skład

- Substancją czynną leku jest paracetamol.
- 1 czopek zawiera 500 mg paracetamolu (Paracetamolum).
- Substancje pomocnicze: tłuszcz stały.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku: nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu; ciężkiej niewydolność nerek i (lub) wątroby; choroby alkoholowej.



Działania niepożądane

Działania niepożądane występujące rzadko (u 1 do 10 osób na 10 000):

- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej takie jak: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień, obrzęk naczynioruchowy.

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 osoby na 10 000):

- zaburzenia krwi i układu chłonnego takie jak: zmiany w obrazie morfologicznym krwi (trombocytopenia z objawami plamicy trombotycznej);
- zaburzenia wątroby i dróg żółciowych takie jak: upośledzenie czynności wątroby;
- zaburzenia nerek i dróg moczowych takie jak: upośledzenie czynności nerek.

Ostrzeżenia

- Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek oraz u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej.
- Podwyższone ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje również u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

FARMINA
Lipska 44
Kraków