

Paracetamol Filofarm, 500 mg, tabletki, 20 tabletek

Cena: 5,51 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	20 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY FILOFARM
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 12 lat

Opis produktu

Opis

Paracetamol **Filofarm** to środek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy. Tabletki mogą być stosowane w przypadku bólów o różnym podłożu, takich jak bóle głowy, menstruacyjne, związane z przeziębieniem, grypą, czy nerwobóle. Lek jest przeznaczony dla dorosłych oraz dzieci powyżej 12. roku życia.

Wskazania

Paracetamol Filofarm stosuje się w bólach różnego pochodzenia, np.: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni, bóle stawów, nerwobóle, bóle miesiączkowe. Wskazaniem do zastosowania leku jest również zmniejszanie gorączki w przebiegu przeziębienia czy grypy.

Działanie

Paracetamol wykazuje działanie zmniejszające ból oraz gorączkę.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1-2 tabletki (500-1000 mg) 3-4 razy na dobę, maksymalnie 8 tabletek na dobę. Dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletkę 3-4 razy na dobę, maksymalnie 4 tabletki na dobę. Należy przestrzegać co najmniej 4 h odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami. Skuteczna dawka dobową nie powinna przekraczać 60 mg/kg na dobę (maksymalna dawka dobową wynosi 2 g). Jeżeli objawy nie ustąpią po 3 dniach stosowania leku, należy zweryfikować diagnozę.

Skład

- Substancją czynną leku jest paracetamol (paracetamolum).
- Substancje pomocnicze: skrobia, poliwinylpirolidon, kwas stearynowy.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku u pacjentów z nadwrażliwością na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników. Przeciwwskazaniem do

zastosowania lek są również: wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej oraz niedokrwistość hemolityczna, a także niedobór reduktazy methemoglobilowej.

Działania niepożądane

- Rzadko występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10000 leczonych pacjentów): nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, reakcje alergiczne: pokrzywka, rumień, świąd, wysypka, plamica barwnikowa, wstrząs anafilaktyczny (zagrożające życiu niedostateczne ukrwienie narządów wskutek gwałtownego spadku ciśnienia krwi spowodowanego gwałtownie przebiegającą reakcją uczuleniową).
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10000 leczonych pacjentów): zaburzenia hematologiczne, tj. małopłytkowość (niedobór płytek krwi) i agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów – pewnego typu białych krwinek).

Ostrzeżenia

- Produkt leczniczy zawiera paracetamol, dlatego aby uniknąć przedawkowania tej substancji należy zwrócić uwagę czy inne środki stosowane w tym samym czasie również go zawierają.
- W czasie stosowania produktu leczniczego nie wolno spożywać alkoholu.
- Paracetamol Filofarm należy ostrożnie stosować w przypadku pacjentów z: łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby/nerek; astmą oskrzelową; ostrym zapaleniem wątroby, głodzonych; nadużywających alkoholu czy stosujących inne leki wpływające na czynność wątroby.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Producent
Filofarm