

Paracetamol Filofarm, 500 mg, tabletki, 50 tabletek

Cena: 9,57 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 tabletek
Postać	Tabletki
Producent	FARMACEUTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY FILOFARM
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Paracetamol Filofarm jest lekiem przeznaczonym do łagodzenia bólu o łagodnym do umiarkowanym nasileniu oraz do obniżania gorączki.

Wskazania

Paracetamol Filofarm jest wskazany w bólach głowy, mięśni, zębów, stawów, nerwobólach, bólach miesiączkowych oraz podczas gorączki.

Działanie

Paracetamol Filofarm jest lekiem, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Dawkowanie

- Dorośli: Doustnie, od 1 lub 2 tabletek (500 mg do 1000 mg paracetamolu), w razie konieczności do 3 lub 4 razy na dobę (maksymalnie w ciągu doby 8 tabletek, czyli 4000 mg paracetamolu).
- Dzieci w wieku powyżej 12 lat Doustnie, 1 tabletkę (500 mg paracetamolu), w razie konieczności do 3 lub 4 razy na dobę (maksymalnie w ciągu doby 4 tabletki, czyli 2000 mg paracetamolu).

Skład

- Substancją czynną leku jest paracetamol.
- 1 tabletkę zawiera 500 mg paracetamolu.
- Substancje pomocnicze: skrobia, poliwinylpirolidon, kwas stearynowy.

Przeciwwskazania

Produktu leczniczego Paracetamol Filofarm nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek z



pozostałych składników tego leku oraz u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby i nerek.

Działania niepożądane

- Rzadko występujące działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów): nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, reakcje alergiczne: pokrzywka, rumień, świąd, wysypka, plamica barwnikowa, wstrząs anafilaktyczny (zagrożające życiu niedostateczne ukrwienie narządów wskutek gwałtownego spadku ciśnienia krwi spowodowanego gwałtownie przebiegającą reakcją uczuleniową).
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 leczonych pacjentów): zaburzenia hematologiczne, tj. małopłytkowość (niedobór płytek krwi) i agranulocytoza (całkowity lub prawie całkowity brak granulocytów – pewnego typu białych krwinek)

Ostrzeżenia

- Należy zachować szczególną ostrożność jeśli pacjent ma niewydolność wątroby, ostre zapalenie wątroby, niewydolność nerek i astmę oskrzelową, nadużywa alkoholu lub jeśli pacjent niedostatecznie się odżywia.
- W okresie przyjmowania produktu nie wolno pić alkoholu.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent

Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM
Kazimierza Pułaskiego 39
85-619 Bydgoszcz