

Paracetamol Forte o smaku pomarańczowym APTEO, 85 ml



Cena: 16,33 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Opakowanie	85 ml
Postać	Zawiesina
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ból, Gorączka
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka

Opis produktu

Opis

Paracetamol forte to produkt leczniczy stosowany w leczeniu krótkotrwałego bólu oraz gorączki o małym bądź umiarkowanym nasileniu.

Dawkowanie

Zalecana dawka dobową paracetamolu to około 60 mg/kg masy ciała na dobę, która jest podzielona na 4 do 6 dawek w ciągu doby, czyli 15 mg/kg masy ciała co 6 godzin lub 10 mg/kg masy ciała co 4 godziny.

Skład

1 mL zawiesiny doustnej zawiera 0,68 mg/mL metylu parahydroksybenzoesanu (E218), 0,12 mg/mL propylu parahydroksybenzoesanu (E216), 500 mg/mL sacharozy i 2,25 mg/mL etanolu.

Zastosowanie

Produkt leczniczy stosowany do krótkotrwałego, objawowego leczenia gorączki (wysokiej temperatury) i (lub) bólu o małym i umiarkowanym nasileniu (np. bólu głowy, bólu gardła, bólu i (lub) gorączki w przebiegu grypy lub przeziębienia, bólu związanego z zapaleniem ucha środkowego, bólu zęba, bolesnego żąbkowania, bólów menstruacyjnych, bólów mięśni i kości, bólu i (lub) gorączki związanych z odczynem poszczepiennym, gorączki w przebiegu ospy wietrznej lub biegunki wirusowej, bólu po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych). Paracetamol FORTE APTEO MED stosowany jest do leczenia bólu o małym i umiarkowanym nasileniu i (lub) gorączki u niemowląt (starszych niż 3 miesiące), dzieci, młodzieży i dorosłych (włączając osoby w wieku podeszłym).

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ostrzeżenia

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed przyjęciem leku Paracetamol FORTE APTEO MED:

- jeśli u pacjenta występują choroby wątroby (w tym zespół Gilberta lub zapalenie wątroby),



- jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,
- jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość hemolityczna (nieprawidłowy rozpad krwinek czerwonych),
- jeśli pacjent jest odwodniony lub przewlekłe niedożywiony,
- jeśli u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej,
- jeśli pacjent stosuje inne leki wpływające na czynność wątroby,
- jeśli pacjent stosuje inne leki zawierające paracetamol, gdyż to może spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby,
- jeśli u pacjenta z astmą oskrzelową występuje uczulenie na kwas acetylosalicylowy

Producent

Synoptis Pharma Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 65
02-255 Warszawa