

Paracetamol Hasco 500 mg, 30 tabletek

Cena: 12,14 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PARACETAMOL
Opakowanie	30 tabletek
Postać	Tabletki powlekane
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Paracetamol Hasco 500 mg to tabletki o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, przeznaczone do stosowania u dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia. Lek jest używany w przypadku gorączki oraz różnych rodzajów bólu, w tym migreny, bólu głowy, mięśni, zębów i innych.

Wskazania

Lek Paracetamol Hasco 500 mg (tabletki) stosuje się u osób w wieku od 6. roku życia:

- w bólach gardła, głowy (w tym w migrenach), zębów,
- w bólach kostnych, stawowych i mięśniowych,
- w bolesnym miesiączkowaniu,
- przy przeziębieniach i stanach grypopodobnych (objawiających się gorączką).

Działanie

Przeciwgorączkowe oraz przeciwbólowe.

Dawkowanie

- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 tabletki, doustnie, do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny, nie więcej niż 8 tabletek na dobę.
- Dzieci w wieku 6–12 lat: 0,5 lub 1 tabletki, do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny, nie więcej niż 4 tabletki na dobę.

Bez uprzedniej konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku regularnie przez dłużej niż 3 dni.



Skład

1 tabletki zawiera:

- substancję czynną: paracetamol (Paracetamolium) 500 mg,
- substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana żelowana, powidon (K-30), potasu sorbinian, magnezu stearynian, otoczka (Opadry II 57U18539 White): hypromeloza, tytanu dwutlenek, polidekstroza, talk, maltodekstryna, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha.

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Paracetamol Hasco.
- Ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby.
- Ciężka niewydolność nerek.
- Choroba alkoholowa.
- Nie podawać leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

- skórne reakcje uczuleniowe: pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

- zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia),
- zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia, agranulocytoza),
- nudności, wymioty, biegunka.

Ostrzeżenia

- Nie należy przyjmować produktu długotrwale, gdyż zwiększa to ryzyko uszkodzenia wątroby.
- Jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby lub nerek, obniżona aktywność dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej, astma z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław