

Paracetamol Hasco, 500 mg, czopki, 10 sztuk

Cena: 9,18 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PARACETAMOL
Opakowanie	10 czopków
Postać	Czopki
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Paracetamol HASCO to lek, który działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.

Wskazania

Wskazaniami do stosowania leku są bóle różnego pochodzenia i stany gorączkowe.

Działanie

Paracetamol HASCO jest lekiem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Czas działania przeciwbólowego wynosi 4-6 godzin. Działanie przeciwgorączkowe trwa 6-8 godzin.

Dawkowanie

Czopki Paracetamol HASCO stosuje się doodbytniczo.

U dorosłych stosuje się dawkę 500 mg jednorazowo. Maksymalna dawka dobową paracetamolu dla osób dorosłych w przypadku leczenia krótkotrwałego wynosi 4,0 g, a długotrwałego 2,6 g. Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 10 dni.

U dzieci dawkę ustala się wg masy dziecka (przeciętnie jednorazowo 10 do 15 mg/kg masy ciała) lub według poniższej tabeli wiekowej.

Dawki jednorazowe

- 3 miesiące-1 rok - 80 mg
- 2-3 lata - 125 mg
- 4-6 lat - 125 mg do 250 mg
- 7-8 lat - 250 mg
- 9-10 lat - 250 mg do 500 mg



- 11–12 lat - 500 mg

Skład

1 czopek zawiera:

- substancję czynną: paracetamol 500 mg
- substancję pomocniczą: tłuszcz stały (Witepsol S58)

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Paracetamol HASCO, jeśli występuje:

- nadwrażliwość na paracetamol,
- ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby,
- choroba alkoholowa,
- ciężka niewydolność nerek.

Działania niepożądane

- Zaburzenia krwi i układu chłonnego

bardzo rzadko (< 1/10 000) : agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość.

- Zaburzenia układu oddechowego

rzadko (>1/10 000 do <1/1000) : obrzęk krtani.

- Zaburzenia nerek i dróg moczowych

bardzo rzadko: kolka nerkowa, niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek, ropomocz.

- Zaburzenia układu immunologicznego

rzadko: obrzęk naczynioruchowy, reakcje rzekomoanafilaktyczne (m.in.: spadek ciśnienia, skurcz oskrzeli, pokrzywka).

bardzo rzadko: uczulenie

- Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

bardzo rzadko: zapalenie wątroby.

Ostrzeżenia

- W czasie stosowania paracetamolu nie należy pić napojów alkoholowych; nie stosować leku u osób uzależnionych od alkoholu. Stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób głodzonych. U pacjentów z astmą, uczulonych na kwas salicylowy może wystąpić uczulenie na paracetamol. Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław