

Paracetamol Hasco Forte 240 mg/ 5 ml, zawiesina doustna dla niemowląt i dzieci od urodzenia, smak truskawkowy, 85 ml



Cena: 29,65 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka
Marka	HASCO-LEK
Opakowanie	85 ml
Postać	Syrop
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Dla niemowlaka, Od 1 dnia życia

Opis produktu

Opis

Paracetamol **Hasco Forte** to lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy dostępny w formie zawiesiny doustnej, przeznaczony do stosowania u niemowląt i dzieci.

Wskazania

- Gorączka.
- Bóle różnego pochodzenia: po zabiegach chirurgicznych, bóle związane z wyrzynaniem się zębów, bóle głowy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu.
- Dolegliwości towarzyszące reakcji organizmu na szczepionkę: ból, gorączka, odczyn miejscowy.
- Dla dzieci i niemowląt od pierwszych dni życia; u niemowląt od 0 do 3. miesiąca życia (o masie ciała do 4 kg): leczenie objawowe gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni, ból o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Od urodzenia do 3 miesiąca życia (do 4 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 1,25 ml (60 mg).

- maksymalna dawka dobową: 5 ml (240 mg).

Od 4 do 8 miesiąca życia (do 7 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 2 ml (96 mg),
- maksymalna dawka dobową: 8 ml (384 mg),

Od 9 do 11 miesiąca życia (do 8 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 2,5 ml (120 mg),
- maksymalna dawka dobową: 10 ml (480 mg).

Od 1 do 2 lat (do 10,5 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 3,25 ml (156 mg),
- maksymalna dawka dobową: 13 ml (624 mg),

Od 2 do 3 lat (do 13 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 4 ml (192 mg),
- maksymalna dawka dobową: 16 ml (768 mg).

Od 4 do 5 lat (do 18,5 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 6 ml (288 mg),
- maksymalna dawka dobową: 24 ml (1152 mg).

Od 6 do 8 lat (do 24 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 7,5 ml (360 mg),
- maksymalna dawka dobową: 30 ml (1440 mg).

Od 9 do 10 lat (do 32 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 10 ml (480 mg),
- maksymalna dawka dobową: 40 ml (1920 mg).

Od 11 do 12 lat (do 45,6 kg):

- zalecana dawka jednorazowa: 14,25 ml (684 mg),
- maksymalna dawka dobową: 57 ml (2736 mg).

Skład

5 ml zawiesiny Paracetamol Hasco Forte zawiera:

- 240 mg paracetamolu (Paracetamolum),
- substancje pomocnicze: sacharoza, guma ksantan (E 415), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), sodu benzoesan (E 211), sodu pirosiarczyn (E 223), aromat truskawkowy naturalny AR 2143 (zawiera naturalne substancje aromatyczne, w tym d-limonen oraz glikol propylenowy), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Leku Paracetamol Hasco Forte nie należy stosować:

- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby lub wirusowym zapaleniem wątroby, u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek,
- w chorobie alkoholowej.

Działania niepożądane

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób):

- skórne reakcje uczuleniowe:
- zapalenie skóry,
- pokrzywka,
- rumień.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

- zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza);
- wymioty,
- nudności,
- biegunka.

Ostrzeżenia

- W razie przedawkowania natychmiast skonsultować się z lekarzem nawet jeśli pacjent czuje się dobrze.
- Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
- Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 3 dni.
- U pacjentów z astmą, uczulonych na kwas acetylosalicylowy może wystąpić uczulenie na paracetamol.
- Lek należy ostrożnie stosować u pacjentów z niewydolnością wątroby i nerek.
- W czasie stosowania leku nie należy pić napojów alkoholowych, nie stosować leku u osób uzależnionych od alkoholu.
- Szczególnie duże ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u osób głodzonych.
- Dostępne wyniki badań wskazują, że podawanie paracetamolu może stanowić czynnik ryzyka rozwoju astmy oraz chorób alergicznych u dzieci.

Producent

HASCO-LEK
Żmigrodzka 242e
Wrocław