

Pedicetamol 60 ml



Cena: 26,90 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PEDICETAMOL
Opakowanie	60 ml
Postać	Roztwór
Producent	POLSKI LEK DYSTRYBUCJA
Przeznaczenie	Przeciwbólowe, Przeciwgorączkowe
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dziecka, Dla niemowlaka, Od 1 dnia życia

Opis produktu

Opis

Pedicetamol to lek w formie roztworu doustnego, specjalnie przeznaczony dla dzieci o masie ciała do 32 kg. Jego zastosowanie obejmuje obniżanie gorączki trwającej maksymalnie 3 dni oraz łagodzenie bólu o stopniu nasilenia od łagodnego do umiarkowanego.

Wskazania

Leczenie gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, dla niemowląt i dzieci do 32 kg (w przybliżeniu od pierwszego dnia życia do 10. lat).

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

- Dzieci poniżej 3. roku życia: paracetamol powinien być stosowany wyłącznie z zalecenia lekarza, zaleca się podawanie roztworu doustnego w postaci kropli (4 mg/kroplę), za pomocą zakraplacza dołączonego do opakowania 30 ml.
- Dzieci od 3. roku życia: zaleca się podawanie roztworu doustnego w mililitrach (ml), za pomocą strzykawki dołączonej do opakowania 60 ml.

Skład

1 ml roztworu zawiera:

- substancję czynną: paracetamol 100 mg,
- substancje pomocnicze: bmakrogol 600, glicerol, aromat malinowy (glikol propylenowy, alkohol etylowy i alkohol benzylowy), sacharyna sodowa, azorubina (karmioizyna) (E122) i woda oczyszczona.

Przeciwwskazania



Kiedy nie stosować leku Pedicetamol:

- w przypadku uczulenia na substancję czynną - paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- Rzadko występujące działania niepożądane: złe samopoczucie, niedociśnienie, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych.
- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane: uszkodzenie wątroby, hipoglikemia, mętny mocz, zmiany liczby krwinek (neutropenia, leukopenia), reakcje skórne.

Ostrzeżenia

- Podczas stosowania leku, nie należy przekraczać zalecanej jednorazowej i dobowej dawki.
- W przypadku zaburzonej czynności nerek, wątroby, serca, płuc, niedokrwistości należy stosowanie leku omówić z lekarzem.
- W przypadku wysokiej gorączki (powyżej 39oC) należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.
- Jeśli ból i gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni lub pojawią się inne objawy, należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek zawiera azorubinę (E 122), która może wywoływać reakcje alergiczne.
- Lek zawiera niewielką ilość etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Po otwarciu, zawartość butelki powinna zostać zużyta maksymalnie w ciągu 6 miesięcy.

Producent

Polski Lek-Dystrybucja Sp. z o.o.
Chopina 10
34-100 Wadowice