

Pelafen, 20 mg/2,5 ml, syrop, 100 ml



Cena: 40,42 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PELAFEN
Opakowanie	100 ml (but.)
Postać	Syrop
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Przeznaczenie	Przeziębienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Syrop Pelafen to tradycyjny lek wykorzystywany w leczeniu objawów przeziębienia. Zawiera suchy wyciąg z korzenia pelargonii i jest przeznaczony do stosowania u dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 6. roku życia.

Wskazania

Wskazaniem do zastosowania syropu Pelafen jest leczenie objawów przeziębienia.

Dawkowanie

Zalecane dawkowanie dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat to 2,5 ml syropu 3 razy dziennie. U dzieci w wieku od 6 do 11 lat podawać 2,5 ml syropu 2 razy dziennie.

Skład

- Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z korzenia pelargonii (Pelargonii radidis extractum siccum).
- 1 ml syropu zawiera 8 mg suchego wyciągu (4-25:1) z Pelargonium sidoides DC i/lub Pelargonium reniforme Curt., radix (korzenia pelargonii). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 11% (m/m).
- Substancje pomocnicze: maltodekstryna, maltitol ciekły (E 965), sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E 420), potasu sorbinian (E 202), kwas cytrynowy (E 330), woda oczyszczona.
- Syrop posiada ciemnoczerwoną barwę i zawiera naturalne składniki, które mogą powodować wytrącanie się osadu.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniem do zastosowania leku Pelafen jest nadwrażliwość na wyciąg z korzenia pelargonii albo którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Działania niepożądane

- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10 000 pacjentów): łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, utrudnione połykanie), łagodne krwawienia z dziąseł lub nosa oraz reakcje alergiczne.
- Częstość nieznana: przypadki uszkodzenia wątroby.

Ostrzeżenia

- Jeśli wystąpi duszność, gorączka, krwista albo ropna płwocina to należy skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku wystąpienia wymiotów, braku apetytu, bólu brzucha, zmęczenia czy żółtego zabarwienia skóry (objawów uszkodzenia wątroby) należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem.
- 1 dawka (2,5 ml) syropu Pelafen zawiera 893 mg maltitolu oraz 625,1 mg sorbitolu (będącego źródłem fruktozy), więc pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

Producent

PHYTOPHARM

Kłęka 1

Nowe Miasto nad Wartą

Galeria

