

Pelafen, 20 mg, tabletki powlekane, 30 tabletek

Cena: 33,66 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Przeznaczenie	Wspomagające, Wzmacniające
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Pelafen to lek przeznaczony do objawowego leczenia przeziębienia, zawierający wyciąg z korzenia pelargonii. Jest odpowiedni dla dzieci powyżej 6. roku życia, młodzieży i dorosłych.

Wskazania

Objawowe leczenie przeziębienia.

Działanie

Pelafen zawiera wyciąg z pelargonii, który jest stosowany w objawowym leczeniu przeziębienia.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 tabletkę 3 razy na dobę (rano, w południe, wieczorem).
- Dzieci 6-12 lat: 1 tabletkę 2 razy na dobę (rano i wieczorem).

Skład

- Substancją czynną jest: suchy wyciąg z korzenia pelargonii *Pelargonium sidoides* DC i/lub *Pelargonium reniforme* Curt., radix.
- 1 tabletkę powlekana zawiera 20 mg suchego wyciągu z korzenia pelargonii (*Pelargonii radicis extractum siccum*) (4-7:1).
- Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 14% (V/V).
- Substancje pomocnicze: ekstrakt: celuloza sproszkowana, krzemionka koloidalna bezwodna; rdzeń tabletki: celuloza mikrokryształiczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 6000, żelaza tlenek żółty E172, żelaza tlenek czerwony E172, tytanu dwutlenek E171, talk.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku Pelafen w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

- Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, ból w nadbrzuszu), reakcje alergiczne, łagodne krwawienia z nosa lub dziąseł.
- Częstość nieznana: toksyczne działanie na komórki wątroby.

Ciąża i karmienie piersią

- Jeśli podczas stosowania leku wystąpią: duszność, gorączka, odkrztuszanie ropnej/krwistej wydzieliny, należy skonsultować się z lekarzem.
- Należy zasięgnąć porady lekarza jeśli w ciągu tygodnia nie ustępują objawy mimo stosowania leku.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent

PHYTOPHARM

Kłęka 1

Nowe Miasto nad Wartą

Galeria

