

Pelafen MED Syrop 100 ml



Cena: 29,43 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PELAFEN
Opakowanie	100 ml (but.)
Postać	Syrop
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Przeznaczenie	Przeziębienie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Pelafen 20 mg/2,5 ml to tradycyjny lek w postaci syropu, który przeznaczony jest do objawowego leczenia przeziębienia. Syrop zawiera suchy wyciąg z korzenia pelargonii (*Pelargonii radicis extractum siccum*) i jest odpowiedni do stosowania u osób dorosłych, młodzieży oraz dzieci powyżej 6. roku życia.

Warto podkreślić, że Pelafen jest tradycyjnym produktem leczniczym, co oznacza, że jego skuteczność i bezpieczeństwo są oparte na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu, a nie na nowoczesnych badaniach klinicznych. Zastosowanie tradycyjnych leków może być ograniczone do łagodzenia objawów, a nie leczenia przyczyny choroby.

Wskazania

Lek Pelafen stosuje się tradycyjnie u osób powyżej 6. roku życia: w objawowym leczeniu przeziębienia.

Działanie

Lek tradycyjnie stosowany w objawowym leczeniu przeziębienia.

Dawkowanie

- Młodzież powyżej 12. roku życia, dorośli (w tym w podeszłym wieku): 2,5 ml syropu 3 razy na dobę.
- Dzieci od 6. do 11. roku życia: 2,5 ml syropu 2 razy na dobę.

Skład

1 ml syropu zawiera:

- substancję czynną: suchy wyciąg z korzenia pelargonii (4-25:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 11% (m/m),
- substancje pomocnicze: maltodekstryna, maltitol ciekły (E965), sorbitol ciekły, niekrystalizujący (E420), potasu sorbinian (E202),

kwas cytrynowy (E 330), woda oczyszczona

Przeciwwskazania

Bardzo ważne jest, aby w przypadku uczulenia na wyciąg z korzenia pelargonii lub jakiegokolwiek inne składniki leku Pelafen, nie stosować tego preparatu. Ponadto, należy pamiętać o ograniczeniach wiekowych, dlatego syrop Pelafen nie powinien być podawany dzieciom poniżej 6. roku życia.

Również stosowanie leku w okresie ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Działania niepożądane

łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, utrudnione połykanie), łagodne krwawienia z dziąseł lub nosa oraz reakcje alergiczne.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ostrzeżenia

Jeśli wystąpią poważne objawy, takie jak duszność, gorączka, krwista lub ropna plwocina, konieczne jest niezwłoczne skonsultowanie się z lekarzem, ponieważ mogą one wskazywać na poważne powikłania i wymagać odpowiedniego leczenia.

Również wystąpienie objawów uszkodzenia wątroby, takich jak wymioty, brak apetytu, ból brzucha, zmęczenie czy żółte zabarwienie skóry, jest sygnałem do natychmiastowego przerwania stosowania leku i bezzwłocznego skonsultowania się z lekarzem, aby ocenić sytuację i podjąć odpowiednie działania.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria

