

Pelavo Med, 100 ml



Cena: 42,33 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PELAVO
Opakowanie	100 ml
Postać	Roztwór
Producent	US PHARMACIA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ułatwiające oddychanie
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 6 lat

Opis produktu

Opis

Pelavo Med to lek tradycyjny stosowany w leczeniu objawów przeziębienia. Jest w postaci roztworu doustnego zawierającego suchy wyciąg z korzenia pelargonii. Preparat ma smak pomarańczowo-mandarynkowy. Pelavo Med jest roślinnym lekiem tradycyjnym przeznaczonym do stosowania w określonych sytuacjach, zgodnie z długotrwałym stosowaniem. W przypadku braku ustąpienia objawów lub wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych, które nie są wymienione w ulotce, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem.

Wskazania

Pelavo Med to tradycyjny roślinny produkt leczniczy, stosowany w objawowym leczeniu przeziębienia.

Działanie

Pelavo Med jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym, odpowiednim do stosowania w wymienionych wskazaniach – wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Dawkowanie

- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 4 ml roztworu 3 razy na dobę (rano, w południe, wieczorem).
- Dzieci w wieku 6–12 lat: 4 ml roztworu 2 razy na dobę (rano i wieczorem).

Skład

4 ml roztworu zawiera:

- substancja czynna: suchy wyciąg z Pelargonium sidoides DC i/lub Pelargonium reniforme Curt., radix (korzenia pelargonii) – Pelargonii radice extractum siccum (4-25:1) 20 mg,
- rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 11% (m/m),

- substancje pomocnicze: wyciąg: maltodekstryna, roztwór: glicerol (E 422), potasu sorbinian (E 202), kwas cytrynowy, guma ksantan, aromat pomarańczowo-mandarynkowy PHS-132958, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na wyciąg z korzenia pelargonii zawarty w leku.
- Uczulenie na inne gatunki pelargonii, na inne rośliny z rodziny Geraniaceae lub na dowolny z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

- łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe:
- biegunka,
- ból w nadbrzuszu,
- nudności,
- wymioty,
- utrudnione połykanie,
- łagodne krwawienia z dziąseł lub nosa,
- reakcje alergiczne.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- Odnotowano przypadki toksycznego działania na komórki wątroby.

Ostrzeżenia

- Nie należy stosować preparatu Pelavo Med z innymi produktami z linii Pelavo, lub z innymi produktami zawierającymi wyciąg z korzenia pelargonii.
- Należy skonsultować się z lekarzem jeśli podczas stosowania leku nasilą się objawy.
- Nie należy przekraczać zalecanej dobowej dawki leku.
- Odnotowano przypadki toksycznego działania preparatu na komórki wątroby, a także przypadki zapalenia wątroby podczas stosowania leku.
- W przypadku wystąpienia objawów hepatotoksyczności należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i udać się do lekarza.
- Jeśli mimo stosowania leku objawy nie ustępują w ciągu 7 dni, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent

USP