


Phenyl Free 2, proszek, 454 g

Cena: 146,84 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	454 g
Postać	Proszek
Producent	MEAD JOHNSON NUTRITION (POLAND) SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Odżywcze
Rodzaj produktu	Żywność
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 1 roku życia

Opis produktu

Opis

Phenyl Free 2 to dietetyczny środek spożywczy przeznaczony do celów medycznych, przeznaczony dla dzieci powyżej 1. roku życia oraz dorosłych, w tym kobiet w ciąży, z potwierdzoną fenyloketonurią. Zapewniają wszystkie niezbędne składniki (z wyjątkiem fenyloalaniny), tłuszcze, węglowodany, minerały i witaminy. W innym przypadku Phenyl Free 1 wyróżnia się niższą kalorycznością i największą zawartością tłuszczu.

Skład

Sacharoza, syrop glukozowy, olej sojowy, modyfikowana skrobia kukurydziana, L-glutamina, L-leucyna, L-asparaginian potasu, chlorowodorek L-lizyny, L-tyrozyna, fosforan wapnia, L-prolina, L-walina, L-izoleucyna, L-alanina, cytrynian sodu, L-arginina, fosforan magnezu, chlorek potasu, L-treonina, fosforan sodu, L-seryna, glicyna, L-histydyna, L-metionina, L-tryptofan, L-cystyna, chlorek choline, etylovanilina, kwas L-askorbinowy, tauryna, inozytol, siarczan żelazawy, L-karnityna, siarczan cynku, nikotynamid, octan DL-alfa-tokoferylu, D-pantotnian wapnia, siarczan miedzi, siarczan manganu, palmitynian retinylu, cyjanokobalamina, chlorowodorek tiaminy, chlorowodorek pirydoksyny, ryboflawina, kwas foliowy, cholekalcyferol, chlorek chromu, molibdenian sodu, jodek sodu, selenin sodu, D-biotyna, fitomenadion.

Sposób użycia

207 g proszku + 860 ml wody daje 1 l mieszanki.

Właściwości

Do postępowania dietetycznego w fenyloketonurii i hiperfenyloalaninemii u dzieci i dorosłych.

Ostrzeżenia

- Phenyl-Free 2HP jest niekompletnym produktem żywieniowym. Nie zawiera fenyloalaniny - aminokwasu stanowiącego niezbędny składnik preparatu i dlatego powinien on być uzupełniany w kontrolowanych ilościach przez inne produkty białkowe zalecane przez lekarza.

- Należy zapewnić dostateczne do prawidłowego rozwoju ilości fenyloalaniny podając dodatkowo inne produkty, które ją zawierają. Lekarz powinien przez cały czas dokładnie nadzorować stosowanie Phenyl Free 2 HP i innych produktów oraz dokonywać korekt ich stosowania na podstawie częstych badań krwi.
- Tylko do podawania doustnego; nie podawać dożylnie.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej tj 15-25 st. C.
- Po otwarciu należy puszkę szczelnie zamknąć i przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Zawartość puszkę należy zużyć w ciągu 1 miesiąca po otwarciu.
- Proszku nie wolno zamrażać i należy chronić przed nadmiernym przegrzaniem.
- Phenyl-Free 2HP należy stosować pod nadzorem lekarza, nie może stanowić jedyne źródła pożywienia
- Phenyl-Free 2HP jest przeznaczony jedynie do żywienia dzieci powyżej 1. roku życia dorosłych oraz kobiet ciężarnych chorujących na fenylketonurię
- Stosowanie Phenyl-Free 2HP do żywienia osób nie chorujących na fenylketonurię I może stanowić zagrożenie dla ich zdrowia.

Producent

MEAD JOHNSON B.V
Middenkampweg 2
Nijmegen, Holandia