

Pikopil 7,5 mg, 10 tabletek

Cena: 18,32 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PIKOPIL
Opakowanie	10 tabletek
Postać	Tabletka
Producent	FARMAK INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów, Od 10 lat

Opis produktu

Opis

Tabletki Pikopil to lek przeczyszczający, który zawiera pikosiarżan sodu jako składnik czynny. Jest urządzeniem usuwającym, łagodzącym problemy związane z nawracającymi lub zastępczymi zaparciami. Lek jest przeznaczony zarówno dla dorosłych, jak i dzieci powyżej 10 roku życia.

Działanie

Pikopil należy do grupy leków przeczyszczających o działaniu drażniącym. Działa poprzez stymulację ruchów jelita oraz zwiększa zawartość wody i elektrolitów w świetle jelita grubego.

Dawkowanie

- Dorośli: 5 mg - 7,5 mg (rozpoczęte od podawania podobnego leku o mniejszej mocy, zwiększone do 1 tabletki produktu Pikopil o mocy 7,5 mg), przed snem.
- Dzieci (od 10 r. ż.) i młodzież: 5 mg - 7,5 mg (rozpoczęte od podawania podobnego leku o mniejszej mocy, zwiększone do 1 tabletki produktu Pikopil o mocy 7,5 mg), przed snem.

Skład

Każda tabletkę leku Pikopil o mocy 7,5 mg zawiera jednowodny pikosiarżan sodu, co odpowiada 7,5 mg bezwodnego pikosiarżanu sodu. Pozostałe składniki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian magnezu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Pikopil:

- jeśli pacjent ma uczulenie na sodu pikosiarżan, inne substancje należące do grupy pochodnych triarylomietanu (np. bisakodyl)

lub którykolwiek z

- pozostałych składników tego leku;
- w przypadku ciężkiego odwodnienia (tj. utraty zbyt dużej ilości wody z ustroju);
- jeśli jelito jest zablokowane (niedrożność jelita);
- w przypadku poważnych zaburzeń brzusznych jak zapalenie wyrostka robaczkowego;
- jeśli występuje ostra choroba zapalna jelita;
- jeśli występuje silny ból w jamie brzusznej, który powoduje nudności lub wymioty;
- jeśli tuż przed przyjęciem leku wystąpi nagły, ostry ból brzucha;
- w przypadku problemu zwanego niedrożnością jelita, który występuje w przypadku zablokowania jelita cienkiego.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.