


Pikopil krop.doustne,roztwór 15ml



Cena: 18,27 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PIKOPIL
Opakowanie	15 ml
Postać	Krople
Producent	FARMAK INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Zaparcia
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Pikopil to lek w postaci kropli doustnych, którego głównym składnikiem jest pikosiarżan sodu. Jest to lek przeczyszczający, który działa miejscowo w jelitach. Jego działanie polega na stymulowaniu perystaltyki jelit, co przyspiesza przesuwanie treści pokarmowej przez jelito grube i zwiększa ilość wody i elektrolitów w jelitach. W efekcie tego działania, Pikopil pomaga w łagodzeniu dolegliwości związanych z przewlekłym lub nawracającym zaparciem.

Ten lek może być stosowany przez osoby dorosłe, a także dzieci powyżej 4 roku życia. Pikosiarżan sodu nie wpływa na procesy trawienia i wchłaniania substancji odżywczych w jelitach cienkich, dlatego nie ma wpływu na kalorie ani na wchłanianie niezbędnych składników odżywczych. Jego główną funkcją jest przyspieszenie ruchów jelit i ułatwienie wypróżnienia.

Warto zawsze stosować leki przeczyszczające zgodnie z zaleceniami lekarza lub zgodnie z instrukcją na opakowaniu, aby uniknąć niepożądanych skutków ubocznych i zapewnić skuteczne i bezpieczne łagodzenie dolegliwości związanych z zaparciem.

Wskazania

Krótkotrwałe łagodzenie dolegliwości związanych z przewlekłym lub nawracającym zaparciem u dorosłych oraz dzieci powyżej 4 lat.

Działanie

- Krople Pikopil są lekiem przeczyszczającym o działaniu drażniącym.
- Działa poprzez stymulację ruchów jelita oraz zwiększa zawartość wody i elektrolitów w świetle jelita grubego.

Dawkowanie

- Dorośli: 8-12 kropli jednorazowo.
- Dzieci powyżej 6 lat: 8-12 kropli jednorazowo;
- Dzieci od 4 do 6 lat: 6 kropli jednorazowo.



Skład

1 ml roztworu (15 kropli) zawiera:

substancję czynną: sodu pikosiarczan w ilości odpowiadającej 7,5 mg bezwodnego sodu pikosiarczanu,
pozostałe składniki: sodu benzoesan, sorbitol, kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, woda do wstrzykiwań.

Przeciwwskazania

Kiedy nie przyjmować leku Pikopil:

- jeśli pacjent ma uczulenie na sodu pikosiarczan, inne substancje należące do grupy pochodnych triarylometanu (np. bisakodyl) lub którykolwiek z
- pozostałych składników tego leku;
- w przypadku ciężkiego odwodnienia (tj. utraty zbyt dużej ilości wody z ustroju);
- jeśli jelito jest zablokowane (nieδροżność jelita);
- w przypadku poważnych zaburzeń brzusznych jak, zapalenie wyrostka robaczkowego;
- jeśli występuje ostra choroba zapalna jelita;
- jeśli występuje silny ból w jamie brzusznej, który powoduje nudności lub wymioty;
- jeśli tuż przed przyjęciem leku wystąpi nagły, ostry ból brzucha;
- w przypadku problemu zwanego nieδροżnością jelita, który występuje w przypadku zablokowania jelita cienkiego.

Działania niepożądane

- biegunka.
- kurcze w jamie brzusznej,
- ból brzucha,
- przykre odczucie w górnej części brzucha.

Ostrzeżenia

- Stosowanie leku długotrwale czy dużych dawek może wpłynąć na poziom elektrolitów w organizmie, szczególnie prawdopodobne jest zmniejszenie stężenia potasu (hipokaliemii), odwodnienie albo biegunka. Podczas oddawania stolca lub z powodu bólu brzucha, wywołanego zaparciem, mogą wystąpić zawroty głowy lub zasłabnięcie.
- Pikopil zawiera sorbitol, więc jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów to należy skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej poniżej 25°C.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu pojemnika: 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Producent

Farmak International Sp. z o.o.
Aleja Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa

Importer

Nord Farm Sp. z o. o.
al. Piłsudskiego 141
92-318 Łódź