

PiniHelix syrop 0,1019g/5ml 120 ml



Cena: 18,57 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	120 ml
Postać	Syrop
Producent	FARMINA SP. Z O.O.

Opis produktu

Opis

Pini Helix

Hederæ helicis extractum fluidum 101,9 mg/5ml

120 ml

Produkt leczniczy roślinny tradycyjnie stosowany w przeziębieniach, wspomagająco w stanach zapalnych dróg oddechowych oraz niezżytach dróg oddechowych przebiegających z uporczywym i męczącym kaszlem.

Syrop PiniHelix to bogaty i naturalny skład zawiera 3 wyciągi ziołowe: standaryzowany wyciąg z liści bluszczu oraz wyciągi z tymianku i lukrecji, na bazie naturalnego ziołomiodu sosnowego.

Składniki syropu upłynniają gęstą zalegającą wydzielinę, ułatwiają jej odkrztuszenie, rozkurczają oskrzela.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny przeznaczony do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Skład:

100 g syropu zawiera:

Substancję czynną:

Płynny wyciąg z liści bluszczu (Hederæ helicis extractum fluidum) 1,7 g,
ekstrahent: etanol 70% (v/v).

Substancje pomocnicze:

Suchy wyciąg z korzenia lukrecji (Glycyrrhizæ radix extr.sicc.) 5,0 g,
ekstrahent: woda do ekstrakcji, amonu wodorotlenek 10%,

Płynny wyciąg z ziela tymianku (Thymi extr. fl) 4,0 g,

ekstrahent: etanol 30% (v/v), woda amoniakalna, glicerol.

Woda amoniakalna, sodu benzoesan, ziołomiód sosnowy, woda oczyszczona

Dawkowanie:



Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 ml (2 łyżeczki do herbaty) 3 razy dziennie.

Wskazania:

Produkt leczniczy roślinny tradycyjnie stosowany w przeziębieniach.

Przeciwwskazania:

Nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, choroby wątroby i nerek, hipokaliemia. Nadwrażliwość na substancje czynne lub pomocnicze zawarte w preparacie.

Uczulenie na miód lub produkty pszczele oraz na benzoosan sodu, rośliny z rodziny Araliowate (Araliaceae).

Działania niepożądane:

Objawy niepożądane występują niezwykle rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne (jak pokrzywka, wysypka skórna, duszności), objawy z przewodu pokarmowego (jak wymioty, nudności, biegunka). Bardzo rzadko przy dłuższym stosowaniu i jednoczesnym przekraczaniu zalecanych dawek mogą pojawić się objawy związane z przyjmowaniem kwasu glicyryzynowego: utrata potasu, zatrzymanie sodu i wody, bóle głowy, nadciśnienie tętnicze, obrzęki, osłabienie mięśni.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 r.ż. Należy zachować ostrożność u pacjentów z nieżytami żołądka oraz z wrzodami. W przypadku odkrztuszania ropnej płwociny, gorączki lub duszności należy zasięgnąć porady lekarza bądź farmaceuty. Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami nie występują zagrożenia związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanych dawek. Nie stosować dłużej niż 7 dni.

Stosowanie podczas ciąży i laktacji:

Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią.

Podmiot odpowiedzialny: Farmina sp. z o.o., ul. Lipska 44, 30-721 Kraków

Wytwórca: Farmina sp. z o.o.,

Zakład w Myślenicach ul. Cegielskiego 2, 32-400 Myślenice

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.