

Pirolam, 1%, (10 mg/g), żel, 20 g

Cena: 27,44 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PIROLAM
Opakowanie	20 g
Postać	Żel
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Grzybica, Świąd
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Pirolam to lek stosowany w leczeniu zakażeń skórnych wywołanych dermatofitami, takich jak grzybica skóry gładkiej, owłosionej oraz stóp. Posiada również właściwości przeciwzapalne. Może być stosowany u dzieci od 6. roku życia, młodzieży i dorosłych.

Wskazania

Pirolam produkt leczniczy stosowany jest w przypadku:

- grzybicy skóry gładkiej i owłosionej,
- grzybicy stóp (na 1 lub obu stopach, między palcami, na podbiciu - podeszwie stopy),
- grzybicy podudzi.

Działanie

Pirolam zawiera cyklopiroks olaminy, która wykazuje działanie przeciwgrzybicze skierowane przeciw dermatofitom, grzybom drożdżopodobnym, pleśniom. Wykazuje również aktywność w przypadku mieszanych zakażeń grzybiczych. Pirolam wykazuje również działanie przeciwzapalne.

Dawkowanie

2 razy na dobę na zmienioną chorobowo skórę. Żel można lekko wetrzeć w skórę lub pozostawić do wyschnięcia.

Skład

- Substancją czynną jest: cyklopiroks z olaminą (Ciclopirox olaminum).
- 1 g żelu zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą.
- Substancje pomocnicze: glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, etanol 96%,

glicerol, karbomer, trolamina, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Pirolam:

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - cyklopiroks olaminy lub pozostały składnik(i) tego leku,
- w przypadku zakażeń grzybiczych oka, okolic oczu, pochwy,
- u dzieci poniżej 6. roku życia.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

- obrzęk.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

Częstość nieznana:

- świąd, pieczenie, rumień, podrażnienie skóry.

Ostrzeżenia

- W przypadku wystąpienia uczulenia, stosowanie Pirolam należy przerwać i skontaktować się z lekarzem.
- Stosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku pacjentów z: cukrzycą, zaburzeniami krążenia (w dłoniach, stopach), zaburzeniem odporności.
- Stosowanie leku skonsultować z lekarzem, jeśli u pacjenta występują choroby skóry jak np. łuszczyca lub inne schorzenia przewlekłe.
- Pirolam żel stosuje się jedynie na skórę, należy unikać okolic oczu.
- Miejsc zmienionych chorobowo nie należy drapać; po myciu/kąpieli miejsca zmienione należy dokładnie osuszyć.
- Pirolam żel zawiera parahydroksybenzoesan metylu i propylu (E218, E216) - składniki te mogą powodować podrażnienie skóry i reakcje alergiczne (również typu późnego).
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.
- Pirolam żel można używać po pierwszym otwarciu przez 3 miesiące.

Producent

MEDANA PHARMA S.A.
Władysława Łokietka 10
Sieradz

Galeria



PIROLAM® LEK

**PIROLAM ŻEL
MOŻNA STOSOWAĆ:**

 Na skórę głowy*

 Na stopy

 Na ręce

*zmyć szamponem z oczu

PIROLAM® LEK

ŻEL NA GRZYBICĘ SKÓRY

Działa przeciwgrzybiczo oraz przeciwzapalnie
(stan zapalny towarzyszący grzybiczy skóry może objawiać się np. jej zaczerwienieniem), dzięki zawartości **cyklopiroksu z olaminą**

→ Stosować 2 razy na dobę

→ Dla dzieci już **powyżej 6. roku życia**

PIROLAM® LEK

**ZASTOPUJ GRZYBICĘ!
WYBIERZ PIROLAM!**

★★★★★
4,6 / 5

Średnia ocena użytkowników na ceneo.pl*

*Ocena na podstawie 145 opinii dostępnych na stronie Ceneo.pl, data: 2024-07-20, źródło: https://www.ceneo.pl/2297622864-medicina