

Pirolam, 1%, zawiesina na skórę, 20 g

Cena: 29,71 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PIROLAM
Opakowanie	20 g
Postać	Zawiesina
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Grzybica
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Pirolam to zawiesina do stosowania miejscowego na skórę, zawierająca cyklopiroks z olaminą o działaniu przeciwgrzybiczym i przeciwzapalnym. Jest stosowany w leczeniu grzybicy skóry gładkiej, owłosionej, stóp i podudzi. Przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci powyżej 6 lat.

Działanie

- Pirolam zawiera cyklopiroks z olaminą, który działa na występujące na skórze dermatofity, grzyby drożdżopodobne, pleśnie oraz mieszane zakażenia grzybicze. Cyklopiroks z olaminą działa także na niektóre bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne a także hamuje wzrost Mycoplasma, Trichomonas i Chlamydia.
- Pirolam wykazuje również działanie przeciwzapalne, co jest szczególnie ważne, jeśli występuje stan zapalny.
- Pirolam przenika do skóry poprzez naskórek, mieszki włosowe i gruczoły łojowe.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 2 razy na dobę należy nanosić zawiesinę na zmienioną chorobowo skórę, lekko wcierając lub pozostawiając do wyschnięcia.

Skład

- Substancją czynną leku jest cyklopiroks z olaminą (Cyclopirox olaminum).
- 1 g zawiesiny na skórę zawiera 10 mg cyklopiroksu z olaminą.
- Substancje pomocnicze: glikol propylenowy, alkohol benzylowy, parafina ciekła, alkohol cetostearylowy, kwas mlekowy, makrogolu eter cetostearylowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pirolam:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeżeli pacjent ma grzybicze zapalenie oka, okolic oczu lub pochwy,
- u dzieci poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

Często występujące działania niepożądane(u 1 do 10 na 100 pacjentów):

- obrzęk.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

- alergiczne kontaktowe zapalenie skóry.

Częstość nieznana:

- pieczenie, podrażnienie skóry, rumień, świąd.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy koniecznie zwrócić się do lekarza w przypadku:

- pacjentów chorych na cukrzycę, zaburzenia krążenia w dłoniach i stopach, zaburzenia odporności (np. zakażenia HIV, pacjenci po transplantacji, pacjenci leczeni jednocześnie kortykosteroidami, pacjenci z nawracającym lub długotrwale utrzymującym się pólpaścem lub opryszczką),
- osób z chorobami skóry, np. łuszczycę lub inne przewlekłe choroby skóry.

Pirolam zawiera glikol propylenowy i alkohol cetostearylowy, które mogą powodować podrażnienia skóry, miejscową reakcję skórą (np. kontaktowe zapalenie skóry).

- Swędzących, zakażonych miejsc nie należy drapać.
- Chronić oczy przed kontaktem z lekiem.
- Unikać noszenia ubrań i obuwia nieprzepuszczającego wilgoci i ciepła.
- Po myciu i kąpieli miejsca chorobowo zmienione należy dokładnie osuszyć.
- Odzież stykającą się ze zmienioną chorobowo skórą, ręczniki i gąbki należy zmieniać codziennie i prać w temperaturze 90°C (zaleca się używanie ręczników jednorazowych).
- Nie należy stosować mydeł o kwaśnym odczynie, ponieważ stwarza to korzystne warunki do rozwoju grzybów z rodzaju Candida.

Producent

MEDANA PHARMA S.A.
Władysława Łokietka 10
Sieradz