


Pirolam, 80 mg/g, lakier do paznokci leczniczy, 4 g



Cena: 98,01 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	PIROLAM
Opakowanie	4 g
Postać	lakier
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Grzybica
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Pirolam to przeciwgrzybiczny lakier do paznokci z cyklopiroksiem jako substancją czynną. Stosuje się go miejscowo na paznokcie przy łagodnej i umiarkowanej grzybicy paznokci, obejmującej do 50% powierzchni paznokcia i maksymalnie 4 z 10 paznokci. Lek jest przeznaczony dla dorosłych do długotrwałego leczenia.

Wskazania

Lakier Pirolam stosuje się w przypadku łagodnej oraz umiarkowanej grzybicy paznokci dłoni lub stóp osób dorosłych, gdy chore są co najwyżej 4 z 10 paznokci i w nie więcej niż 50%.

Działanie

Zawarty w preparacie cyklopiroks jest syntetyczną pochodną pirydynonu i wykazuje działanie przeciwgrzybicze. Mechanizm działania związany jest z przenikaniem przez płytkę paznokcia i gromadzeniem się substancji czynnej w dużej ilości w komórkach chorobotwórczych grzybów, prowadząc do zaburzenia transportu substancji odżywczych. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozpad komórek grzyba.

Dawkowanie

Zalecane dawkowanie zmienia się z czasem stosowania leku. Leczenie można podzielić na kilka etapów:

- 1) Pierwszy miesiąc: lakier nakładać co drugi dzień na chorobowo zmieniony paznokieć – etap nasycenia paznokcia cyklopiroksiem.
- 2) Drugi miesiąc: nakładanie lakieru można ograniczyć do 2 razy w tygodniu.
- 3) Trzeci miesiąc: stosować raz w tygodniu.

Skład

- Substancją czynną jest cyklopiroks.
- 1 g lakieru zawiera 80 mg cyklopiroksu.
- Substancje pomocnicze: alkohol izopropylowy, polimer metoksyetenu z estrem monobutylovym kwasu 2-butenodiowego.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku:

- jeśli pacjent ma uczulenie na cyklopiroks lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Działania niepożądane

U nielicznych pacjentów obserwowano miejscowe podrażnienie (pieczenie, świąd, rumień, obrzęk, zaczerwienienie i łuszczenie) po kontakcie leku Pirolam ze skórą otaczającą paznokcie.

Ostrzeżenia

- Produkt leczniczy do stosowania zewnętrznego, wyłącznie na paznokcie. Należy unikać kontaktu z błonami śluzowymi i oczami.
- Produkt łatwopalny, używać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
- Zaleca się, aby przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym pacjenci szczególnie narażeni na zakażenia grzybicze paznokci (pacjenci z zaburzeniami krążenia obwodowego, cukrzycą, osłabioną odpornością spowodowaną zaburzeniami układu immunologicznego), pacjenci z łuszczycą lub innymi przewlekłymi chorobami skóry, pacjenci z dystrofią paznokci i uszkodzeniami płytki paznokciowej, z obrzękiem, zaburzeniami oddychania (zespół żółtych paznokci) zwrócili się do lekarza.
- Jeśli pojawiły się nowe zmiany na pozostałych paznokciach lub nowe zmiany o charakterze rumieniowym, złuszczaczącym na skórze w okolicy zmienionych chorobowo paznokci. W takim przypadku należy dodatkowo rozważyć leczenie ogólnoustrojowe.

Producent

MEDANA PHARMA S.A.
Władysława Łokietka 10
Sieradz

Galeria

