

Pirolam Intima Vag, 500 mg, tabletki dopochwowe, 1 tabletki

Cena: 40,04 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet
Marka	PIROLAM
Opakowanie	1 tabletki
Postać	Tabletki
Producent	ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Przeznaczenie	Grzybica
Rodzaj produktu	Lek bez recepty
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Pirolam Intima Vag to lek stosowany w leczeniu zakażeń pochwy i sromu (zewnętrznych narządów płciowych) wywołanych przez grzyby, zazwyczaj Candida, wrażliwe na klotrymazol. Przeznaczony jest dla nastolatek od 16 roku życia oraz dorosłych kobiet.

Wskazania

Pirolam Intima Vag przeznaczony jest do miejscowego leczenia ginekologicznych infekcji grzybiczych.

Działanie

Lek Pirolam Intima Vag ma działanie przeciugrzybicze.

Dawkowanie

- Dorosli i młodzieży w wieku od 16 lat: Jedna tabletki dopochwowa, głęboko dopochwowo, w dawce jednorazowej, przed snem.
- Młodzieży w wieku od 12 do 15 lat : U młodzieży w wieku poniżej 16 lat, Pirolam Intima Vag można stosować tylko po konsultacji z lekarzem. W przypadku stosowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentek (po pierwszej miesiączce), zalecane dawkowanie jest takie samo, jak u dorosłych.

Skład

- Substancja czynna jest klotrymazol.
- Każda tabletki dopochwowa zawiera 500 mg klotrymazolu (Clotrimazolum).
- Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, kwas adypinowy, sodu wodorowęglan, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, skrobia ziemniaczana, skrobia kukurydziana.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Działania niepożądane

- Często (częściej niż u 1 na 100 osób): pieczenie;
- Niezbyt często (częściej niż u 1 na 1 000 osób): ból brzucha, swędzenie, zaczerwienienie skóry i (lub) podrażnienie;
- Rzadko (częściej niż u 1 na 10 000 osób): reakcje alergiczne, obrzęk, wysypka skórna, krwawienie z pochwy;
- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): złuszczenie w obrębie narządów płciowych, uczucie dyskomfortu, bóle w obrębie miednicy.

Ostrzeżenia

Należy zapewnić wilgotne środowisko pochwy, aby tabletkę rozpuściła się całkowicie. W przeciwnym wypadku nierozpuszczone części tabletki mogą wyschnąć się z pochwy. Aby tego uniknąć zaleca się umieszczenie tabletki tak głęboko dopochwowo, jak to możliwe, przed położeniem się do łóżka.

Nie należy stosować produktu leczniczego Pirolam Intima Vag w trakcie miesiączki. Należy zakończyć stosowanie tego produktu leczniczego przed rozpoczęciem krwawienia miesiączkowego.

Partner seksualny również powinien zostać poddany miejscowemu leczeniu, jeżeli występują u niego objawy, takie jak np. świąd, stan zapalny.

Producent

POLPHARMA SA
Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Galeria

